

# Задачи для Конференции школьников

А.М. Райгородский

## 1 Экстремальные системы множеств

### 1.1 Вступление

Прежде всего рассмотрим множество  $\mathcal{R}_n = \{1, 2, \dots, n\}$ . В этом множестве возьмем произвольные сочетания  $M_1, \dots, M_s$  с некоторым  $s$  и составим из них совокупность  $\mathcal{M} = \{M_1, \dots, M_s\}$ . Если  $|M_i| = k$  для каждого  $i$ , то назовем совокупность  $\mathcal{M}$  *k-равномерной*. Если в  $\mathcal{R}_n$  задана  $k$ -равномерная совокупность  $\mathcal{M}$ , состоящая из  $s$  множеств, то будем говорить также, что  $\mathcal{M}$  – это совокупность с параметрами  $(n, k, s)$ .

Как можно интерпретировать несколько сухую абстракцию, которую мы описали выше? Ну, например, представим себе, что  $k = 2$ . Тогда у нас есть  $\mathcal{R}_n$  – множество из  $n$  чисел – и некоторый набор (неупорядоченных) пар элементов из  $\mathcal{R}_n$  – совокупность  $\mathcal{M}$ . Да ведь это самый обычный граф! В нем  $\mathcal{R}_n$  служит множеством вершин, а  $\mathcal{M}$  – множеством ребер.

Если  $k \geq 3$ , то, по упомянутой только что причине, пару  $H = (\mathcal{R}_n, \mathcal{M})$  называют *гиперграфом*. Скажем, 3-равномерный гиперграф образуют все остроугольные треугольники с вершинами в некотором (фиксированном) множестве точек  $X$  на обычной плоскости. (Если таких треугольников нет, то тоже, конечно, не беда: просто множество "ребер" гиперграфа в этом случае будет пустым.)

Гиперграфы играют огромную роль в математике. И в частности, исключительно важны гиперграфы, которые оптимальны с той или иной точек зрения. Сейчас нас будут особенно интересовать гиперграфы, которые обладают наибольшим количеством ребер при условии, что эти ребра удовлетворяют некоторому ограничению на взаимное расположение. Такие гиперграфы "работают" в теории кодирования и в комбинаторной геометрии. Знакомиться с ними и с их применением мы будем посредством задач.

### 1.2 Основные задачи

**Задача 1.1.** Найдите число различных совокупностей с параметрами  $(n, k, s)$ .

**Задача 1.2.** Назовем совокупность  $\mathcal{M} = \{M_1, \dots, M_s\}$  *t-пересекающейся*, если  $|M_i \cap M_j| \geq t$  для любых  $i$  и  $j$ . Докажите, что для произвольных  $n$  и  $k$  существует 1-пересекающаяся совокупность с параметрами  $(n, k, s)$ , где  $s \geq C_{n-1}^{k-1}$ .

**Задача 1.3.** Докажите, что при  $k \leq \frac{n}{2}$  размер  $s$  любой 1-пересекающейся совокупности с параметрами  $(n, k, s)$  не превосходит  $C_{n-1}^{k-1}$ . Зачем нужно условие  $k \leq \frac{n}{2}$ ?

**Задача 1.4.** Докажите, что для произвольных  $n$  и  $k$  существует  $t$ -пересекающаяся совокупность с параметрами  $(n, k, s)$ , где  $s \geq C_{n-t}^{k-t}$ .

**Задача 1.5.** Найдите какие-нибудь значения параметров  $n, k, t$ , при которых  $2k - t < n$  и, тем не менее, существует  $t$ -пересекающаяся совокупность с параметрами  $(n, k, s)$ , где  $s > C_{n-t}^{k-t}$ . Зачем нужно условие  $2k - t < n$ ?

**Задача 1.6\*.** Найдите какие-нибудь последовательности  $k = k(n) \rightarrow \infty$  и  $t = t(n) \rightarrow \infty$  при  $n \rightarrow \infty$ , для которых  $2k - t < n$  и, тем не менее, существуют  $t$ -пересекающиеся совокупности с параметрами  $(n, k, s)$ , где  $s/C_{n-t}^{k-t} \rightarrow \infty$ .

**Задача 1.7.** Назовем совокупность  $\mathcal{M} = \{M_1, \dots, M_s\}$   $t$ -непересекающейся, если  $|M_i \cap M_j| \neq t$  для любых  $i$  и  $j$ . Обозначим через  $S(n, k, t)$  мощность самой большой  $t$ -непересекающейся совокупности с параметрами  $n$  и  $k$ . Найдите  $S(n, 3, 1)$ .

**Задача 1.8.** Найдите  $S(10, 5, 2)$ .

**Задача 1.9.** Найдите  $S(11, 5, 2)$ .

**Задача 1.10.** Докажите, что  $c_1 n^2 \leq S(n, 5, 2) \leq c_2 n^2$ , где  $c_1, c_2$  — некоторые положительные константы.

**Задача 1.11.** Назовем  $(n, k, t)$ -кодом произвольную совокупность  $\mathcal{M}$  с параметрами  $(n, k, s)$ , в которой любые два множества пересекаются не более чем по  $t$  общим элементам. Найдите мощность  $s$  наибольшего  $(6, 3, 1)$ -кода.

### 1.3 Приложения

Назовем *хроматическим числом пространства*  $\mathbb{R}^n$  величину  $\chi(\mathbb{R}^n)$ , равную минимальному количеству цветов, в которые можно так покрасить все точки  $\mathbb{R}^n$ , чтобы расстояние между одноцветными точками не равнялось единице.

**Задача 2.1.** Докажите, что  $\chi(\mathbb{R}^1) = 2$ .

**Задача 2.2.** Докажите, что  $4 \leq \chi(\mathbb{R}^2) \leq 7$ .

**Задача 2.3.** Докажите, что  $\chi(\mathbb{R}^n) \geq n + 2$  при  $n \geq 2$ .

**Задача 2.4.** Докажите, что  $\chi(\mathbb{R}^n) < \infty$  для любого  $n$ .

**Задача 2.5.** Докажите, что хроматическое число не изменится, если, вместо единичного расстояния, запрещать любое другое фиксированное расстояние  $a > 0$  между точками одного цвета.

**Задача 2.6.** Докажите, что для любых  $n, k, t$  справедлива оценка  $\chi(\mathbb{R}^n) \geq \frac{C_n^k}{S(n, k, t)}$ , а стало быть, верно и неравенство

$$\chi(\mathbb{R}^n) \geq \max_{k, t} \frac{C_n^k}{S(n, k, t)}.$$

**Указание.** Пусть дана совокупность  $\mathcal{M}$  с параметрами  $(n, k, C_n^k)$ . Сопоставим каждому множеству  $M \in \mathcal{M}$  вектор  $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$ , у которого  $x_i = 1$ , если  $i \in M$ , и  $x_i = 0$ , если  $i \notin M$ . Получится совокупность векторов  $\mathcal{X} \subset \mathbb{R}^n$ ,  $|\mathcal{X}| = C_n^k$ . Положим, далее,  $a = \sqrt{2k - 2t}$  (ср. задачу 2.5). Заметим, что множества из  $\mathcal{M}$  пересекаются по  $t$  элементам тогда и только тогда, когда отвечающие им векторы отстоят друг от друга на расстояние  $a$ .

**Задача 2.7.** Докажите, что  $\chi(\mathbb{R}^n) \geq cn^2$ , где  $c > 0$ .

**Задача 2.8.** Докажите, что  $\chi(\mathbb{R}^n) \geq cn^3$ , где  $c > 0$ .

## 2 Экстремальные системы векторов

### 2.1 Вступление

В задаче 2.6 мы уже сталкивались с тем, что множества можно "кодировать"  $(0,1)$ -векторами, а мощности пересечений множеств – расстояниями между соответствующими векторами. На самом деле, мощность пересечения множеств в точности равна скалярному произведению отвечающих им  $(0,1)$ -векторов. Поэтому прямым обобщением задачи об отыскании величины  $S(n, k, t)$  служит следующая задача. Пусть  $\mathcal{X}$  – произвольная совокупность  $n$ -мерных  $(-1,0,1)$ -векторов, в каждом из которых ровно  $k$  координат величины  $\pm 1$  и ровно  $n - k$  координат величины  $0$ . Предположим, что в  $\mathcal{X}$  скалярное произведение  $(\mathbf{x}, \mathbf{y})$  произвольных векторов  $\mathbf{x}, \mathbf{y}$  не равно  $t$ . Спрашивается, как ведет себя величина  $X(n, k, t)$ , равная максимальной мощности описанного множества  $\mathcal{X}$ ?

### 2.2 Основные задачи

**Задача 3.1.** Докажите, что при  $n = 2k$  и нечетном  $k$  выполнена оценка  $X(n, k, 0) \geq 2^{n-1}$ .

**Задача 3.2.** Найдите  $X(2, 1, 0)$  и  $X(4, 2, 0)$ .

**Задача 3.3.** Найдите  $X(6, 3, 0)$ .

**Задача 3.4.** Покажите, что  $X(8, 4, 0) \leq 70$ .

**Задача 3.5.** Покажите, что  $X(8, 4, 0) \geq 35$ .

**Задача 3.6.** Уточните оценку из задачи 3.4.

**Задача 3.7.** Уточните оценку из задачи 3.5.

**Задача 3.8.** Найдите  $X(8, 4, 0)$ .

**Задача 3.9.** Исследуйте поведение величины  $X(16, 8, 0)$ .

**Задача 3.10.** Найдите какое-нибудь  $n = 2k$  с нечетным  $k$ , при котором  $X(n, k, 0) > 2^n$ .

**Задача 3.11.** Докажите, что при  $n = 2k$ ,  $k \rightarrow \infty$ , выполнено  $\frac{X(n, k, 0)}{2^n} \rightarrow \infty$ .

**Задача 3.12\*.** Докажите, что при  $n = 2k$ ,  $k \rightarrow \infty$ , выполнено  $\frac{X(n, k, 0)}{(2.1)^n} \rightarrow \infty$ .

**Задача 3.13.** Исследуйте поведение величины  $X(n, k, t)$  при произвольных значениях аргументов.

## 2.3 Приложения

**Задача 4.1.** Докажите, что

$$\chi(\mathbb{R}^n) \geq \max_{k, t} \frac{C_n^k 2^k}{X(n, k, t)}.$$

**Задача 4.2.** Попробуйте за счет задачи 4.1 уточнить неравенство  $\chi(\mathbb{R}^n) \geq cn^3$ .

## 3 Близкие мероприятия и литература

Я и мои коллеги (А.В. Савватеев, В.А. Кошелев, Д.А. Мусатов, Г.Г. Гусев, А.А. Кустарев, А.А. Чернов, А.Е. Ромащенко и др.) организуем кружок для старшеклассников. Всю информацию о кружке можно найти на сайте <http://circle.combalg.ru>. Кроме того, в феврале мы проводим школу под Костромой (см. <http://www.lmsh.ru/index.php?pg=14>). Разумеется, там обсуждаются и будут обсуждаться весьма разнообразные задачи по комбинаторике, теории алгоритмов, теории игр, логике, геометрии и даже биоинформатике. Однако приведенным выше задачам там тоже будет уделено внимание.

Имеется много популярной литературы по теме. Например, см. [1] – [5].

## Список цитированной литературы

- [1] А.М. Райгородский, *Хроматические числа*, Москва, МЦНМО, 2003.
- [2] А.М. Райгородский, *Проблема Борсука*, Москва, МЦНМО, 2006.

- [3] А.М. Райгородский, *Линейно-алгебраический метод в комбинаторике*, Москва, МЦНМО, 2007.
- [4] А.М. Райгородский, *Вероятность и алгебра в комбинаторике*, Москва, МЦНМО, 2008.
- [5] А.М. Райгородский, О.И. Рубанов, В.А. Кошелев, *Хроматические числа*, Квант, N3 (2008), 13-22.