Домашние задачи

С. В. Конягин

Задача 1. Если $n < 4^t$, то для вычисления a^n нужно не более $3t - 1$ умножений.

Задача 2. Пункт 6.

Задача 3. Найти количество раскрасок правильного p-угольника в a цветов. Раскраски считаются одинаковыми, если они могут совпасть после некоторого поворота окружности.

Домашние задачи

С. В. Конягин

Задача 1. Если $n < 4^t$, то для вычисления a^n нужно не более $3t - 1$ умножений.

Задача 2. Пункт 6.

Задача 3. Найти количество раскрасок правильного p-угольника в a цветов. Раскраски считаются одинаковыми, если они могут совпасть после некоторого поворота окружности.

Домашние задачи

С. В. Конягин

Задача 1. Если $n < 4^t$, то для вычисления a^n нужно не более $3t - 1$ умножений.

Задача 2. Пункт 6.

Задача 3. Найти количество раскрасок правильного p-угольника в a цветов. Раскраски считаются одинаковыми, если они могут совпасть после некоторого поворота окружности.

Домашние задачи

С. В. Конягин

Задача 1. Если $n < 4^t$, то для вычисления a^n нужно не более $3t - 1$ умножений.

Задача 2. Пункт 6.

Задача 3. Найти количество раскрасок правильного p-угольника в a цветов. Раскраски считаются одинаковыми, если они могут совпасть после некоторого поворота окружности.

Домашние задачи

С. В. Конягин

Задача 1. Если $n < 4^t$, то для вычисления a^n нужно не более $3t - 1$ умножений.

Задача 2. Пункт 6.

Задача 3. Найти количество раскрасок правильного p-угольника в a цветов. Раскраски считаются одинаковыми, если они могут совпасть после некоторого поворота окружности.