

## Симметрии поверхностей и вещественные алгебраические кривые

С. М. Натализон

Еще древние считали, что красота и совершенство связаны с симметрией. С этой точки зрения самой совершенной поверхностью является сфера, имеющая бесконечную группу симметрий. Разумеется, не все поверхности обладают такой большой группой симметрий. В этой статье мы обсудим, какими группами симметрии могут обладать поверхности в зависимости от их топологического типа. Мы увидим, что эта проблема связана с топологическими свойствами вещественных алгебраических кривых.

1. Перейдем к точным определениям. Взаимно однозначное и взаимно непрерывное отображение называется *гомеоморфизмом*. Поверхности, между которыми существует гомеоморфизм, называются *гомеоморфными*. Гомеоморфными являются, например, сфера и куб (рис. 1). Не все поверхности, разумеется, гомеоморфны сфере. Не гомеоморфен сфере, например, тор (рис. 2).

Различные поверхности можно склеивать между собой. Для этого надо вырезать у каждой из них по диску и склеить поверхности по границам разрезов (рис. 3). Если к сфере приклейть тор, то получится снова тор.




Рис. 1.




Рис. 2.




Рис. 3.

Рис. 4.

Но если к сфере приклейть  $g > 1$  торов, то получится поверхность, не гомеоморфная ни сфере, ни тору. Всякая поверхность, гомеоморфная поверхности такого типа, называется *поверхностью рода  $g$* . Сфера имеет род 0, тор — род 1. (На рис. 3 и 4 изображены две поверхности рода 4). Всякая компактная связная ориентируемая поверхность  $P$  без границы является поверхностью некоторого рода  $g = g(P)$ . Поверхности различных родов не гомеоморфны.

**2.** В привычном со школы понимании симметрия — это отображение поверхности в себя, сохраняющее расстояние между точками. Такие отображения образуют группу, называемую *группой изометрий*. Самую большую группу изометрий имеет сфера  $\mathbb{S} = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$ . Бесконечную группу изометрий имеет и тор  $\mathbb{T}$ , получающийся вращением вокруг оси  $Y$  окружности  $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid (x - 2)^2 + y^2 = 1\}$ . Можно доказать, однако, что поверхности рода  $g > 1$  имеют лишь конечную группу изометрий.

Всякая симметрия поверхности  $P$  является автогомеоморфизмом, то есть гомеоморфизмом поверхности на себя. Именно это свойство является решающим при исследовании конечных групп изометрий поверхности. Поэтому мы будем пользоваться следующим определением:

*Поверхностью с симметриями* называется пара  $(P, G)$ , состоящая из связной поверхности  $P$  и конечной группы  $G$  ее автогомеоморфизмов.

Поверхности с симметриями  $(P_1, G_1)$  и  $(P_2, G_2)$  считаются *топологически эквивалентными*, если существует гомеоморфизм  $\varphi: P_1 \rightarrow P_2$  такой, что  $\varphi G_1 \varphi^{-1} = G_2$ .

Если все автогомеоморфизмы из  $G$  сохраняют ориентацию, мы будем говорить, что  $(P, G)$  — *поверхность с ориентируемыми симметриями*.

Поверхностями рода 0 с ориентируемыми симметриями являются, например, пары  $(\mathbb{S}, G)$ , где

- 1)  $G$  — группа поворотов сферы  $\mathbb{S}$  вокруг оси  $Z$  на углы  $2\pi/n$ ;
- 2)  $G$  — группа, порожденная отражениями в прямых  $\ell_0, \dots, \ell_{n-1}$ . Здесь  $\ell_0$  — это ось  $X$ , а  $\ell_k$  получается из  $\ell_0$  поворотом на угол  $k\pi/n$  в плоскости  $X, Y$ ;
- 3)  $G$  — ориентируемая группа симметрии платонового тела, вписанного в  $\mathbb{S}$ . (Напомним, что существует ровно пять платоновых тел, т. е. правильных многогранников: тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр, икосаэдр. Группы симметрии куба и октаэдра совпадают. Группы симметрии додекаэдра и икосаэдра также совпадают [1], см. также статью [2] в настоящем сборнике.)

Оказывается, что любая поверхность рода 0 с ориентируемыми симметриями топологически эквивалентна одной из этих поверхностей.

Поверхности рода 1 с ориентируемыми симметриями также поддаются классификации. Она сводится к классификации двумерных кристаллографических групп, т. е. дискретных групп движений евклидовой плоскости. Все такие группы описываются теоремой Федорова [3].

Поверхности с симметриями  $(P, G)$  рода 0 и 1 могут иметь группу симметрии  $G$  произвольно большого порядка. Для поверхностей рода  $g > 1$  это уже не так. Согласно теореме Гурвица [4], в этом случае порядок ориентируемой группы симметрии не превосходит  $84(g-1)$ . Отсюда следует, в частности, что число топологических типов поверхностей с ориентируемыми симметриями конечно. Для небольших родов ( $g < 6$ ) все такие типы удается найти [5, 6]. Можно найти также все топологические типы поверхностей с ориентируемыми симметриями, образующими группу вида  $\mathbb{Z}_p \times \dots \times \mathbb{Z}_p$ , где  $p$  — простое число [7].

**3.** Перейдем теперь к симметриям, меняющим ориентации поверхности  $P$ . Имеющий неподвижные точки и меняющий ориентацию автоморфизм  $\tau$  назовем *зеркальной симметрией*. Группа  $\langle \tau \rangle$ , порожденная зеркальной симметрией  $\tau$ , состоит из 2 элементов, т. е.  $\tau^2 = 1$ . Связная поверхность с симметрией  $(P, \langle \tau \rangle)$  будет называться *зеркальной поверхностью*.

Простейший пример зеркальной поверхности — это сфера  $\mathbb{S}$  с инволюцией  $\tau(x, y, z) = (x, y, -z)$  (т. е.  $\tau$  — это отражение в плоскости  $z = 0$ ).

Построим теперь более широкую серию примеров.

Давайте рассмотрим поверхность рода  $h$ , расположенную в пространстве  $\mathbb{R}^3 = \{(x, y, z)\}$  таким образом, чтобы ее часть, лежащая в полупространстве  $z < 0$ , состояла из  $n$  отдельных дисков. Обозначим через  $P^+$  часть поверхности, лежащую в полупространстве  $z \geq 0$ . Отображение  $\tau(x, y, z) = (x, y, -z)$  переводит ее в поверхность  $P^-$ . Инволюция  $\tau$  индуцирует на поверхности  $P_{g,n} = P^+ \cup P^-$  рода  $g = 2h + n - 1$  инволюцию  $\tau_n$ . Таким образом,  $(P_{g,n}, \langle \tau_n \rangle)$  — зеркальная поверхность рода  $g$ .




Рис. 5.

Неподвижные точки инволюции  $\tau_n$  — это граничные контуры  $c_1, \dots, c_n$  поверхности  $P^+$ . Они разделяют поверхность  $P_{g,n}$  на две части  $P^+$  и  $P^-$  (рис. 5).

Зеркальные поверхности  $(P, \langle \tau \rangle)$ , топологически эквивалентные  $(P_{g,n}, \langle \tau_n \rangle)$ , мы будем называть *зеркальными поверхностями типа  $(g, n, 1)$* . Инволюция  $\tau$  в этом случае называется *разделяющей*. Очевидно, что поверхность типа  $(g, k, 1)$  существует, если и только если  $1 \leq k \leq g + 1$  и  $k \equiv g + 1 \pmod{2}$ .

Модифицируем теперь эту конструкцию. Каждый из контуров  $c_1, \dots, c_n$  имеет свою симметрию  $\eta_i$ :  $c_i \rightarrow c_i$  — «поворот на угол  $\pi$ ». Давайте разрежем  $P_{g,n}$  по контурам  $c_1, \dots, c_r$  ( $1 \leq r < n$ ) и склеим их вновь «с поворотом на  $\pi$ ». Получится новая поверхность  $\tilde{P}_{g,n}$  рода  $g$ , на которой инволюция  $\tau_n$  индуцирует новую инволюцию  $\tau_{n-r}$ :  $\tilde{P}_{g,n} \rightarrow \tilde{P}_{g,n}$ . Неподвижные точки инволюции  $\tau_{n-r}$  — это контуры  $c_{r+1}, \dots, c_n$ . И они не разбивают поверхность  $\tilde{P}_{g,n}$  (контуры  $c_1, \dots, c_r$  под действием инволюции  $\tau_{n-r}$  поворачиваются «на угол  $\pi$ », и, следовательно, не содержат неподвижных точек). Согласно нашим определениям,  $(\tilde{P}_{g,n}, \langle \tau_{n-r} \rangle)$  — зеркальная поверхность рода  $g$ .

Зеркальные поверхности  $(P, \langle \tau \rangle)$ , топологически эквивалентные  $(\tilde{P}_{g,n}, \langle \tau_{n-r} \rangle)$ , будут называться *зеркальными поверхностями типа  $(g, n-r, 0)$* . Инволюция  $\tau$  такой поверхности называется *неразделяющей*. Рассмотренная конструкция показывает, что поверхность типа  $(g, k, 0)$  существует, если и только если  $1 \leq k \leq g$ . Неподвижные точки отображения в этом случае распадаются на  $k$  простых замкнутых контуров, не разбивающих поверхность.

Замечательная теорема Вайхольда [8] утверждает, что *любая зеркальная поверхность*  $(P, \langle \tau \rangle)$  является зеркальной поверхностью типа  $(g, k, \epsilon)$  (где  $\epsilon = 0$  или  $1$ ). Более того, зеркальные поверхности топологически эквивалентны, если и только если они имеют одинаковый тип. (Простое доказательство этой теоремы можно найти в [9]).

Из теоремы Вайхольда следует, в частности, что множество неподвижных точек зеркальной симметрии  $\tau$  распадается на  $k$  простых замкнутых контуров, называемых *зеркалами*. Мы будем обозначать число зеркал через  $|\tau|$ .

**4.** Произвольная поверхность с симметриями  $(P, G)$  может, разумеется, содержать несколько зеркальных симметрий  $\tau_1, \dots, \tau_n \in G$ . Оказывается, что этот набор  $\{\tau_1, \dots, \tau_n\}$  обладает рядом замечательных свойств. Первое из них  $|\tau_i| \leq g+1$  (неравенство Харнака) сразу следует из теоремы Вайхольда. Из нее же следует, что эта оценка достигается. Достигается также и оценка  $|\tau_1| + |\tau_2| \leq 2g + 2$  (см. рис. 6).




Рис. 6.

Тем более удивительной кажется теорема, утверждающая, что

$$\sum_{i=1}^n |\tau_i| \leq 42(g-1) \text{ при } g > 1 \quad [10]$$

и даже, более того,

$$\sum_{i=1}^n |\tau_i| \leq 12(g-1) \text{ при } g > 9 \quad [11].$$

Если  $\alpha \in G$  является зеркальной симметрией и  $h \in G$ , то  $\beta = h\alpha h^{-1}$  будет тоже зеркальной симметрией. Такие симметрии называются *сопряженными*. Оказывается, что максимальное число попарно несопряженных

зеркальных симметрий не превосходит  $2(\sqrt{g}+1)$  и эта оценка достигается для бесконечного числа разных  $g$  [12]. Если все эти симметрии разделяющие, то суммарное число их зеркал не превосходит  $2g - (n-9)2^{n-3} - 2 \leqslant 2g + 30$  [13]. Если же  $g$  — четное, то попарно несопряженных зеркальных симметрий не более четырех [14].

Удаётся также полностью перечислить все группы  $G$ , содержащие зеркальные симметрии с числом зеркал, равным или большим чем род поверхности [10, 15].

**5.** Эти чисто топологические результаты имеют важные приложения в теории алгебраических кривых. Начнем с определений.

*Плоская аффинная кривая над полем  $\mathbb{K}$*  определяется полиномом  $F(x, y)$  с коэффициентами из  $\mathbb{K}$ . Множеством ее  $\mathbb{K}$ -точек является множество пар  $(x, y) \in \mathbb{K}^2$  таких, что  $F(x, y) = 0$ . Говоря о кривых над полем  $\mathbb{K}$ , мы будем всегда считать, что они имеют  $\mathbb{K}$ -точки.

Простейшая нетривиальная аффинная кривая — это гиперэллиптическая кривая  $F(x, y) = y^2 - f(x)$ , где  $f(x)$  — многочлен с попарно различными корнями  $x_1, x_2, \dots, x_{2n-1}$ . Если  $F$  — вещественная кривая (т. е.  $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ) и  $f(x) = \prod_{i=1}^{2n-1} (x - x_i)$ , где  $x_1 < \dots < x_{2n-1} \in \mathbb{R}$ , то ее вещественные точки — это пары  $(x, \pm\sqrt{f(x)})$ , где  $x \in [x_{2i-1}, x_{2i}]$  ( $i = 1, \dots, n-2$ ) или  $x > x_{2n-1}$ . После добавления точки  $(\infty, \infty)$  множество вещественных точек кривой  $F$  распадается на  $n$  замкнутых контуров, называемых овалами (рис. 7).




Рис. 7.

Поскольку вещественные числа являются частным случаем комплексных чисел, мы можем рассматривать аффинную кривую  $F(x, y) = y^2 - f(x)$  и как комплексную кривую (т. е.  $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ ). Ее комплексные точки имеют вид  $(x, \pm\sqrt{f(x)})$ , где в качестве  $x$  может теперь выступать любое комплексной число  $x \in \mathbb{C}$ . Поэтому множество комплексных точек комплексной кривой связано и двулистно накрывает множество  $\mathbb{C}$ . После добавления точки  $(\infty, \infty)$  это множество превращается в компактную поверхность рода  $g = n - 1$ .

Похожее строение имеет и множество комплексных точек произвольной плоской комплексной аффинной кривой  $F$ . Оно получается

выкалыванием и склеиванием конечного числа точек некоторой (возможно, несвязной) поверхности  $\mathbb{C}(F)$ . Если  $\mathbb{C}(F)$  — связная поверхность, то говорят, что кривая *неприводима*.

Напомним, что *рациональной функцией* называется отношение многочленов. Произвольная рациональная замена переменных  $x \mapsto \xi(s, t)$ ,  $y \mapsto \eta(s, t)$  с коэффициентами из  $\mathbb{K}$  переводит аффинную кривую  $F(x, y)$  в аффинную кривую  $\tilde{F}(s, t)$ . Если существует и обратная рациональная замена с коэффициентами из  $\mathbb{K}$   $s \mapsto \alpha(x, y)$ ,  $t \mapsto \beta(x, y)$ , то говорят, что кривые  $F(x, y)$  и  $\tilde{F}(s, t)$  бирационально изоморфны над  $\mathbb{K}$ . Класс бирациональной изоморфности плоской аффинной кривой называется *алгебраической кривой*.

Поверхности  $\mathbb{C}(F)$ , отвечающие бирационально изоморфным аффинным комплексным алгебраическим кривым, отождествляются. Поэтому можно считать, что неприводимой комплексной алгебраической кривой  $F$  отвечает некоторая поверхность  $\mathbb{C}(F)$  рода  $g = g(F)$ .

Вспользуемся теперь тем, что вещественные числа являются частным типом комплексных чисел. Поэтому мы можем рассматривать плоскую вещественную кривую  $F$  и как аффинную комплексную кривую  $F_{\mathbb{C}}$ . На языке точек это означает, что кроме вещественных решений уравнения  $F(x, y) = 0$  мы рассматривает и его комплексные решения. Вещественная кривая  $F$  называется *неприводимой*, если  $F_{\mathbb{C}}$  — неприводимая комплексная кривая. Далее мы считаем, что все рассматриваемые кривые неприводимы.

Ввиду вещественности коэффициентов полинома  $F$  вместе с каждым решением  $(x, y) \in \mathbb{C}$  уравнения  $F(x, y) = 0$  решением этого уравнения является также и пара  $(\bar{x}, \bar{y})$ . Таким образом, соответствие  $(x, y) \mapsto (\bar{x}, \bar{y})$  порождает зеркальную симметрию  $\tau_F: \mathbb{C}(F_{\mathbb{C}}) \rightarrow \mathbb{C}(F_{\mathbb{C}})$ . Его неподвижные точки — это вещественные точки кривой  $F$ . Как мы уже знаем, эти точки образуют  $k \leq g + 1$  зеркал. Эти зеркала называются *овалами* вещественной кривой  $F$ . Вещественная гиперэллиптическая кривая  $F = y^2 - f(x)$ , например, имеет  $n = g + 1$  овалов, отвечающих отрезкам  $[x_1, x_2], [x_3, x_4], \dots, [x_{2n-1}, \infty]$  (см. рис. 7).

Таким образом, мы сопоставили каждой вещественной алгебраической кривой  $F$  зеркальную поверхность  $(\mathbb{C}(F_{\mathbb{C}}), \langle \tau_F \rangle)$ . Можно доказать, что это соответствие является взаимно однозначным [16].

**6.** Соответствие между алгебраическими кривыми и поверхностями позволяет исследовать следующий важный для приложений вопрос: насколько полно комплексификация  $F_{\mathbb{C}}$  вещественной алгебраической кривой  $F$  определяет саму вещественную кривую?

На языке аффинных кривых этот вопрос означает следующее: какими свойствами обладают бирациональные комплексные замены переменных

$(x, y) \leftrightarrow (\xi, \eta)$ , переводящие друг в друга вещественные аффинные кривые  $F(x, y)$  и  $\tilde{F}(s, t)$ . Приведем пример, показывающий, что такие замены существуют.

ПРИМЕР. Кривая  $F_1(x, y) = y^2 - x(x^8 - 1)$  переводится обратимой заменой  $(s \mapsto x = e^{i\frac{\pi}{8}}s, t \mapsto y = e^{i\frac{9}{16}\pi}t)$ ,  $(x \mapsto s = e^{-i\frac{\pi}{8}}x, y \mapsto t = e^{-i\frac{9}{16}\pi}y)$  в кривую  $F_2(s, t) = t^2 - s(s^8 + 1)$ . Эта же кривая  $F_1$  переводится обратимой заменой  $(u \mapsto x = \frac{u-i}{-u-i}, v \mapsto y = \frac{4e^{i\frac{\pi}{4}}}{(u+i)^5}v)$ ,  $(x \mapsto u = i\frac{1-x}{1+x}, y \mapsto v = \frac{8e^{i\frac{\pi}{4}}}{(x+i)^5}y)$  в кривую  $F_3(u, v) = v^2 - u(u^4 - 1)(u^4 - 6u^2 + 1)$ .

На геометрическом языке вещественным кривым с общей комплексификацией отвечают различные зеркальные симметрии  $\tau$  одной и той же поверхности  $P$ . Уточним это соответствие. На самом деле поверхность  $P = \mathbb{C}(L)$ , отвечающая комплексной алгебраической кривой  $L$ , является римановой поверхностью, то есть обладает комплексной структурой. Это означает, что маленькая окрестность каждой точки поверхности взаимно однозначно проектируется на комплексную плоскость  $\mathbb{C}$ , и все эти проекции согласованы между собой. Например, в случае комплексной гиперэллиптической кривой эта проекция почти для всех точек имеет вид  $((x, \sqrt{f(x)}) \mapsto x)$ . При  $g > 1$  автоморфизмы, сохраняющие эту комплексную структуру, образуют конечную группу, называемую группой автоморфизмов римановой поверхности.

Если  $L = F_{\mathbb{C}}$  — комплексификация вещественной алгебраической кривой  $F$ , то зеркальная симметрия  $\tau_F$  меняет комплексную структуру на комплексно сопряженную. Другими словами,  $\tau_F$  является антиголоморфной инволюцией. Более того, оказывается, что любая антиголоморфная инволюция с неподвижными точками  $\tau: P \rightarrow P$  имеет вид  $\tau = \tau_F$ , где  $F$  — некоторая вещественная алгебраическая кривая [16].

Кроме того, произведение любых двух антиголоморфных инволюций является автоморфизмом римановой поверхности. Таким образом, антиголоморфные инволюции порождают конечную группу  $G$ , и мы получаем поверхность с симметриями  $(P, G)$ .

Бирациональный изоморфизм над  $\mathbb{R}$  вещественных кривых  $F$  и  $\tilde{F}$  означает, что отражения  $\tau_F$  и  $\tau_{\tilde{F}}$  сопряжены в группе  $G$ . Таким образом, вещественным кривым с римановой поверхностью  $P$  взаимно однозначно отвечают классы сопряженности зеркальных симметрий из  $G$ . Это соответствие между вещественными алгебраическими кривыми и зеркальными симметриями позволяет использовать топологические свойства зеркальных симметрий для исследования бирациональных отображений между алгебраическими кривыми.

Проиллюстрируем это на примере описанных выше вещественных алгебраических кривых  $F_1$ ,  $F_2$ ,  $F_3$ . Их общая комплексификация является римановой поверхностью  $P$  рода 4. Эти кривые имеют соответственно два, один и четыре овала. Топологическая классификация поверхностей с симметриями  $(P, G)$ , где группа  $G$  содержит симметрии с таким числом овалов, показывает, что в этом случае множество зеркальных симметрий из  $G$  распадается на 3 класса сопряженности. Таким образом, всякая зеркальная симметрия из  $G$  сопряжена зеркальной симметрии  $\tau_{F_i}$ , где  $i = 1, 2, 3$ . На языке бирациональных отображений это означает, что если между вещественными алгебраическими кривыми  $F$  и  $F_1$  существует обратимое бирациональное отображение с комплексными коэффициентами, то между кривой  $F$  и одной из кривых  $F_i$  ( $i = 1, 2, 3$ ) существует обратимое бирациональное отображение с вещественными коэффициентами. Этот, казалось бы формулярный факт, по-видимому, невозможно доказать без использования топологических соображений [10] и методов, основанных на геометрии Лобачевского [15].

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- [1] Энциклопедия элементарной математики. Кн. 4. Геометрия. М. 1963.
- [2] Бугаенко В. О. Правильные многогранники // Математическое просвещение, 2003. Сер. 3. Вып. 7. С. 107–116.
- [3] Федоров Е. С. Симметрия и структура кристаллов. Основные работы. М., 1949. С. 111–255.
- [4] Hurwitz A. Algebraische Gebilde mit eindeutigen Transformationen in sich // Math. Ann., 1893. Vol. 41.
- [5] Kuribayashi I., Kuribayashi A. Automorphism groups of compact Riemann surfaces of genera three and four // J. Pure Appl. Algebra, 1990, Vol. 65. No 3. P. 277–292.
- [6] Kuribayashi A., Kimura H. Automorphism groups of compact Riemann surfaces of genus five // J. Algebra, 1990, Vol. 134. No 1. P. 80–103.
- [7] Costa A., Natanzon S. M. Topological classification of  $Z_p^m$  actions on surfaces // Michigan Math. J., 2002. Vol. 50. No 3. P. 451–460.
- [8] Weichold G., Über symmetrische Riemann'shen Flächen und die Periodizitätsmoduli der zugehörigen Abel'shen Normalintegrale erster Gattung // Zeitschrift. fur Math. and Phys., 1883. Bd. 28. P. 321–351.
- [9] Натанzon С. М. Клейновы поверхности // УМН, 1990. Т. 45. Вып. 6. С. 47–90.

- [10] Натанзон С. М. Конечные группы гомеоморфизмов поверхностей и вещественные формы комплексных алгебраических кривых // Труды Моск. математического общества, 1988. Т. 51. С. 3–53.
- [11] Gromadzki G. On a Harnack – Natanzon theorem for the family of real forms of Riemann surfaces // J. of Pure and App. Algebra, 1997. N. 121. P. 253–269.
- [12] Натанzon С. М. О порядке конечной группы гомеоморфизмов поверхности на себя и числе вещественных форм комплексной алгебраической кривой // Докл. АН СССР, 1978. Т. 242. №46. С. 765–768.
- [13] Natanzon S. M. Geometry and algebra of real form of complex curves // Math. Zeitschrift, 2002.
- [14] Gromadzki G., Izquierdo M. Real forms of a Riemann surface of even genus // Proc. Amer. Math. Soc., 1998. Vol. 126. No 12. P. 3475–3479.
- [15] Натанzon С. М. Геометрия Лобачевского и автоморфизмы комплексных  $M$ -кривых // Геометрические методы в задачах анализа и алгебры. Межвузовский тематический сборник. Ярославль, 1978. №268. С. 130–151.
- [16] Alling N., Greenleaf L. Foundations of the theory of Klein surfaces. Lecture Notes in Math. No 219, Berlin-Heidelberg-N.Y.: Springer-Verlag, 1971. 117 p.