
По мотивам задачника «Математического просвещения»

Теорема о блохе и кузнечике

А. А. Заславский

А. В. Спивак

Эта заметка посвящена решению задачи 8.5 из задачника «Математического просвещения». Напомним ее формулировку.

Для иррационального числа $\alpha > 1$ обозначим $N(\alpha) = \{[n\alpha] \mid n \in N\}$. Для каких натуральных k найдутся числа $\alpha_1, \dots, \alpha_k$, такие, что множества $N(\alpha_1), \dots, N(\alpha_k)$ образуют разбиение натурального ряда.

Сразу приведем ответ: $k = 2$. Существование искомых чисел для $k = 2$ вытекает из *теоремы о блохе и кузнечике*, доказанной известным физиком и математиком лордом Рэлеем.

ТЕОРЕМА. Множества $N(\alpha), N(\beta)$ задают разбиение натурального ряда тогда и только тогда, когда числа α и β удовлетворяют равенству

$$\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} = 1. \quad (1)$$

Необходимость условия (1) почти очевидна. Действительно, для любого n количество элементов множества $N(\alpha)$, не превосходящих n , равно $\left[\frac{n+1}{\alpha}\right]$. Предположим, что $\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} > 1$. Тогда при $n \rightarrow \infty$

$$\left[\frac{n+1}{\alpha}\right] + \left[\frac{n+1}{\beta}\right] - n > n\left(\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} - 1\right) - 1 \rightarrow \infty,$$

т. е. существует бесконечно много чисел, входящих как в $N(\alpha)$, так и в $N(\beta)$. Аналогично, при $\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} < 1$ существует бесконечно много чисел, не входящих ни в одно из двух множеств.

Докажем достаточность условия (1). Предположим сначала, что некоторое число $n \in N(\alpha) \cap N(\beta)$. Это означает, что найдутся натуральные x, y , такие,

что $[x\alpha] = [y\beta] = n$, т. е. выполнены неравенства

$$\begin{cases} n < x\alpha < n+1, \\ n < y\beta < n+1. \end{cases}$$

Преобразовав эту систему к виду

$$\begin{cases} \frac{x}{n+1} < \frac{1}{\alpha} < \frac{x}{n}, \\ \frac{y}{n+1} < \frac{1}{\beta} < \frac{y}{n} \end{cases}$$

и сложив неравенства, получим

$$\frac{x+y}{n+1} < 1 < \frac{x+y}{n},$$

или $n < x+y < n+1$, что невозможно, так как $x, y \in N$.

Аналогично, если некоторое $n \notin N(\alpha) \cup N(\beta)$, то найдутся x, y , удовлетворяющие системе неравенств

$$\begin{cases} x\alpha < n, \\ (x+1)\alpha > n+1, \\ y\beta < n, \\ (y+1)\beta > n+1, \end{cases}$$

из которой после преобразований вытекает $n-1 < x+y < n$.

Теорема Рэлея имеет очевидное

СЛЕДСТВИЕ. Если числа α и β удовлетворяют равенству

$$\frac{m}{\alpha} + \frac{n}{\beta} = 1 \tag{2}$$

для некоторых натуральных m и n , то $N(\alpha) \cap N(\beta) = \emptyset$.

Действительно, числа $\alpha' = \alpha/m$, $\beta' = \beta/n$ удовлетворяют (1), следовательно, $N(\alpha') \cap N(\beta') = \emptyset$, но $N(\alpha) \subset N(\alpha')$, $N(\beta) \subset N(\beta')$.

Основной нашей целью будет доказательство обратного утверждения: для любых α, β , таких, что $N(\alpha) \cap N(\beta) = \emptyset$, найдутся натуральные m, n , удовлетворяющие равенству (2).

Пусть γ — число, дополнительное к α ($\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\gamma} = 1$). Тогда по теореме Рэлея для любого натурального n между $[n\beta]$ и $[(n+1)\beta]$ найдется число, кратное γ , т. е. $\{[n\beta]/\gamma\} > 1 - 1/\gamma$ или

$$\{n\beta/\gamma\} - \{n\beta\}/\gamma \in (1 - 1/\gamma, 1) \pmod{1}. \tag{3}$$

Рассмотрим тор $0 \leq x < 1, 0 \leq y < 1$ и будем отмечать на нем точки вида $Z_n = (\{n\beta/\gamma\}, \{n\beta\})$. В силу (3) все Z_n лежат вне параллелограмма P , ограниченного прямыми $y = 0, y = 1, y = \gamma x, y - 1 = \gamma(x - 1)$. Заполним экземплярами тора всю плоскость, тогда все точки Z_n попадут на прямую $y = \frac{\{\beta\}}{\{\beta/\gamma\}}x$. Если угловой коэффициент этой прямой иррационален, точки Z_n всюду плотно заполняют тор, и (3) не выполняется. Действительно, в этом случае числа $\{\beta/\gamma\}, \{\beta\}$ и 1 попарно

несоизмеримы, и по теореме об обмотке трехмерного тора множество точек вида $(\{\beta/\gamma t\}, \{\beta t\}, \{t\})$, $t \in R$ плотно в торе $0 \leq x, y, z < 1$. Соответственно, точки Z_n всюду плотно заполняют грань этого тора $z = 0$. Аналогично доказывается, что если угловой коэффициент рационален, но прямая пересекает какой-нибудь из параллелограммов P , (3) также не может выполняться. Из рис. 1 видно, что для того, чтобы прямая не пересекала P , она должна пройти через какую-то из точек $(m, m - 1)$, где $m > (m - 1)\gamma$.




Рис. 1.

Таким образом, имеем $\{(m - 1)\beta\} = \{m\beta/\gamma\}$ или $(m - 1)\beta = m\beta/\gamma + n$, что равносильно исходному утверждению.

Теперь уже совсем просто установить, что $k = 2$ единственный ответ к задаче 8.5. Действительно, предположим, что натуральный ряд можно разбить на $k > 2$ множества вида $N(\alpha)$. Тогда существуют три числа α, β, γ , такие, что множества $N(\alpha), N(\beta), N(\gamma)$ попарно не пересекаются, и по доказанному утверждению найдутся натуральные $m_1, m_2, m_3, n_1, n_2, n_3$, такие, что выполнены равенства

$$\begin{cases} \frac{m_3}{\beta} + \frac{n_2}{\gamma} = 1, \\ \frac{n_3}{\alpha} + \frac{m_1}{\gamma} = 1, \\ \frac{m_2}{\alpha} + \frac{n_1}{\beta} = 1. \end{cases}$$

Эти равенства можно рассматривать, как систему линейных уравнений относительно $\frac{1}{\alpha}, \frac{1}{\beta}, \frac{1}{\gamma}$. Поскольку определитель системы равен $m_1 m_2 m_3 + n_1 n_2 n_3 > 0$, она должна иметь единственное, и причем рациональное, решение, что невозможно.

Из приведённого рассуждения следует также, что никакое множество $N(\alpha)$ не может быть разбито на 2 или больше множеств такого же вида.

А. А. Заславский, ЦЭМИ РАН,
email: zaslavsky@mccme.ru

А. В. Спивак, гимназия №1543,
email: spivak@mccme.ru