
Задачник

(составители А. Я. Канель-Белов, И. В. Митрофанов)

Условия задач

В этом разделе вниманию читателей предлагается подборка задач разной степени сложности, в основном трудных. Надеемся, что эти задачи окажутся интересными для читателей «Математического просвещения», в том числе для сильных школьников, интересующихся математикой.

Мы обращаемся с просьбой ко всем читателям, имеющим собственные подборки таких задач, присылать их в редакцию. Мы с удовольствием будем публиковать свежие авторские задачи.

В скобках после условия задачи указывается автор (уточнения со стороны читателей приветствуются).

На базе решения трудной задачи неоднократно появлялась научная статья (в том числе у школьника), а также доклад на конференции (школьной или взрослой). Так что призываем присылать решения опубликованных задач. Составители задачника помогут с публикациями и докладами на конференциях.

1. Пусть число p простое. Есть неограниченный запас бусинок n цветов. Сколько можно составить различных ожерелий, содержащих ровно p бусинок? Два ожерелья, переводящиеся друг в друга поворотом, считаются одинаковыми. Выведите из результата задачи **малую теорему Ферма**: если p простое, n натуральное, то n^p сравнимо с n по модулю p .
(Фольклор)
2. Любой ли трёхгранный угол имеет сечение, являющееся правильным треугольником?
(Фольклор)
3. Даны два конечных частично упорядоченных множества M и N , а также отображение $f: M \rightarrow N$ с таким свойством, что любая пара срав-

нимых элементов M переходит в пару несравнимых, а любая пара несравнимых элементов переходит в пару сравнимых. Докажите, что элементы $x_i \in M$ можно так занумеровать числами от 1 до $|M|$ и расставить в ряд таким образом, что $x_i < x_j$ тогда и только тогда, когда $i < j$ и при этом x_i стоит левее x_j .

(Е. М. Вечтомов, А. Я. Канель-Белов)

4. Пусть λ — число, меньшее единицы, а последовательность c_n задана рекуррентно:

$$c_0 = 0, \quad c_{k+1} = \frac{1}{2} \left(c_k + \sqrt{c_k^2 + 4\lambda^{k+1}(1-\lambda)} \right).$$

Предел этой последовательности обозначим $c(\lambda)$. Найдите предел $c(\lambda)$, если λ стремится к единице слева.

(Д. Р. Гайфулин)

5. а) Дана полоса $2 \times n$, заполненная знаками $+$ и $-$. За одну операцию разрешается поменять знаки в одном столбце, строке или диагонали. Каково минимальное число операций, гарантированно достаточное для того, чтобы сделать все знаки плюсами?

б) Тот же вопрос для полосы $3 \times n$.

(А. Я. Канель-Белов)

6. Докажите, что радикальный центр трёх полувписанных окружностей треугольника (т. е. окружностей, которые касаются двух сторон треугольника и его описанной окружности) лежит на прямой OI , где O — центр описанной окружности, а I — центр вписанной окружности.

(К. В. Козеренко)

7. Докажите равенства

а) $\cos \frac{8\pi}{35} + \cos \frac{12\pi}{35} + \cos \frac{18\pi}{35} = \frac{1}{2} \left(\cos \frac{2\pi}{5} + \sqrt{7} \sin \frac{2\pi}{5} \right)$. (В. А. Сендеров)

б) $\sqrt[3]{\cos \frac{\pi}{19} + \cos \frac{7\pi}{19} + \cos \frac{11\pi}{19}} + \sqrt[3]{\cos \frac{3\pi}{19} + \cos \frac{5\pi}{19} + \cos \frac{17\pi}{19}} +$
 $+ \sqrt[3]{\cos \frac{9\pi}{19} + \cos \frac{13\pi}{19} + \cos \frac{15\pi}{19}} =$
 $= \sqrt[3]{\frac{1}{2} - 3\sqrt[3]{7}} + \frac{3}{2} \sqrt[3]{3\sqrt[3]{49} + 18\sqrt[3]{7} - 25} + \frac{3}{2} \sqrt[3]{3\sqrt[3]{49} + 18\sqrt[3]{7} - 44}$.

(С. В. Маркелов)

в) $\sqrt[5]{\frac{\cos(2\pi/11) \cos(4\pi/11)}{\cos^2(16\pi/11)}} + \sqrt[5]{\frac{\cos(4\pi/11) \cos(8\pi/11)}{\cos^2(32\pi/11)}} +$
 $+ \sqrt[5]{\frac{\cos(8\pi/11) \cos(16\pi/11)}{\cos^2(2\pi/11)}} + \sqrt[5]{\frac{\cos(16\pi/11) \cos(32\pi/11)}{\cos^2(4\pi/11)}} +$
 $+ \sqrt[5]{\frac{\cos(32\pi/11) \cos(2\pi/11)}{\cos^2(8\pi/11)}} =$

$$= \sqrt[5]{276 + 170\sqrt[5]{11} - 40\sqrt[5]{11^2} - 80\sqrt[5]{11^3} - 15\sqrt[5]{11^4}}.$$

(С. В. Маркелов, К. И. Пименов)

8. (Албанское неравенство.) Шестиугольник $ABCDEF$ вписан в окружность. Докажите, что

$$\sqrt[3]{AD \cdot BE \cdot CF} \geq \sqrt[3]{AB \cdot CD \cdot EF} + \sqrt[3]{BC \cdot DE \cdot FA}.$$

Для каких шестиугольников достигается равенство? (Dorlir Ahmeti)

9. (По мотивам леммы Сарда.) а) Пусть f — дифференцируемая функция, определённая на \mathbb{R} . Пусть A — множество точек x , где $f'(x) = 0$. Может ли $f(A)$ быть множеством всех чисел?

Пусть f — действительнзначная гладкая функция на плоскости, A — множество точек, в которых обе её частные производные равны 0. Может ли $f(A)$ быть множеством всех чисел, если

б) f — класса гладкости C^2 ?в) f — класса гладкости C^1 ?

(И. В. Митрофанов)

10. а) (Открытый вопрос.) Дан многочлен $P(n)$ с целыми коэффициентами. Верно ли, что обязательно найдётся такое $n \in \mathbb{N}$, что все простые делители числа $P(n)$ строго меньше n ? (С. В. Конягин)

Покажите, что такое n обязательно найдётся, еслиб) $P(n) = n^k - 1$;

(С. В. Конягин)

в) $P(n) = an^k + b$;

(С. В. Конягин)

г) P — квадратный трёхчлен (уже для кубического ответ неизвестен).

(А. Я. Канель-Белов)

11. Бесконечной равномерно гладкой дугой будем называть траекторию точки, которая начала движение по плоскости в момент времени $t = 0$ и движется со скоростью 1 и с ускорением, не превосходящим 1. (Иными словами, это образ гладкого отображения $\gamma: [0; +\infty) \rightarrow \mathbb{R}^2$ с условиями $|\dot{\gamma}(t)| = 1$ и $|\ddot{\gamma}(t)| \leq 1$ при всех $t \geq 0$).

Пусть внутри ограниченной области нарисована *несамопересекающаяся* бесконечная равномерно гладкая дуга $\gamma(t)$. Обязательно ли найдётся такая точка x этой дуги, что любая достаточно маленькая окружность с центром в точке x пересекает дугу $\gamma(t)$ ровно в двух точках?

(Н. Н. Константинов)

12. Покажите, что группа с тремя образующими a, b, c и соотношениями $bab^{-1} = a^2, cbc^{-1} = b^2, aca^{-1} = c^2$ тривиальна. (Фольклор)

13. Внутри тетраэдра единичного объёма находится параллелепипед. Каков максимально возможный его объём? (А. Я. Канель-Белов)

14. Натуральные попарно различные $a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n$ таковы, что для любого непустого подмножества индексов $I \subseteq \{1, \dots, n\}$ число $2020! + \sum_{i \in I} a_i$ делится на $\sum_{i \in I} b_i$. Для какого наибольшего n это возможно?
(В. Брагин, М. Сагафьян)
15. (По мотивам статьи Д. Ревелла¹⁾.) В каждой целой точке прямой имеется лампочка. Каждая лампочка может находиться в одном из двух состояний — ВКЛ и ВЫКЛ. Изначально все лампочки выключены. В момент времени $t = 0$ в точке с координатой 0 находится безумный фонарщик. Каждую минуту он производит в указанном порядке следующие действия:
- случайным образом изменяет или не изменяет состояние лампочки в той целой точке, в которой находится;
 - случайным образом перемещается одну из двух соседних целых точек.
- Все 4 варианта действий на каждом ходу равновероятны. Обозначим $F(n)$ вероятность того, что в момент времени $t = n$ ситуация такая же, как и в начале, т. е. фонарщик находится в точке 0, а все лампочки погашены. Докажите, что для некоторых положительных c_1 и c_2 при всех n выполнено двойное неравенство

$$e^{-c_1 n^{1/3}} < F(2n) < e^{-c_2 n^{1/3}}. \quad (\text{И. В. Митрофанов})$$

Уточнение формулировок

Приводим уточнённые формулировки задач 20.4 (выпуск 20, с. 250) и 26.4'(б) (выпуск 27, с. 248).

Задача 20.4. Последовательность $\{a_n\}$ называется *линейной рекуррентой порядка k* , если для некоторых b_1, \dots, b_k при всех $n \geq k$ выполняется равенство $b_0 a_n + b_1 a_{n-1} + \dots + b_k a_{n-k} = 0$. Пусть $b_0 = 1$, $a_i, b_i \in \mathbb{Z}$ при всех i . Докажите, что либо последовательность $\{a_n\}$ содержит член, имеющий не менее 2016 различных простых делителей, либо множество натуральных чисел разбивается на непересекающиеся арифметические прогрессии, на каждой из которых наша рекуррентна пропорциональна геометрической прогрессии.

Задача 26.4'(б). Обобщите и решите задачу из п. (а) для случая попадания $k + 1$ птички в $(k - 1)$ -мерное подпространство.

¹⁾ *Revelle D.* Heat Kernel Asymptotics on the Lamplighter Group // Electron. Commun. Probab. 8 (2003), 142–154.