Листок 7. Теорема Сарда. Трансверсальность (23 октября)

67. Пусть $f : M^n \to \mathbb{R}^N$ — погружение. Докажите, что если $N > 2n$, то композиция отображения f и проекции на почти любую гиперплоскость $\mathbb{R}^{N-1} \subset \mathbb{R}^N$ является погружением.

68. Пусть M^n — компактное многообразие и $f : M^n \to \mathbb{R}^N$ — вложение. Докажите, что если $N > 2n + 1$, то композиция отображения f и проекции на почти любую гиперплоскость $\mathbb{R}^{N-1} \subset \mathbb{R}^N$ является вложением.

69. Рассмотрим в пространстве матриц $M_{n,\,m}$ подмножество $M_{n,\,m,\,k}$, состоящее из всех матриц ранга k. Докажите, что если $k \leqslant \min(m,\,n)$, то $M_{n,\,m,\,k}$ — многообразие размерности $k(m+n-k)$.

70. Пусть $U \subset \mathbb{R}^m$ — открытое множество, $f : U \to \mathbb{R}^n$ — гладкое отображение. Докажите, что если $n \geqslant 2m$, то для почти всех линейных отображений $A : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$ отображение $g : U \to \mathbb{R}^n$, заданное формулой $g(x) = f(x) + Ax$, является иммерсией.

71. Докажите, что если M^n — компактное многообразие с непустым краем W^{n-1}, то не существует гладкой ретракции $r : M^n \to W^{n-1}$. (**Указание**. Пусть $a \in W^{n-1}$ — регулярное значение. Тогда $r^{-1}(a)$ — одномерное компактное подмногообразие, край которого лежит в W^{n-1}.)

72. Пусть M^n — многообразие без края (не обязательно компактное), $f : M^n \to N^{n+1}$ — такое вложение, что $f(M^n)$ — замкнутое множество. Докажите, что если многообразие N^{n+1} односвязно, то многообразие M^n ориентируемо. (**Указание**. 1) Если при обходе вдоль кривой γ ориентация многообразия $M^n \subset N^{n+1}$ изменяется, то существует кривая $\tilde{\gamma}$ в N^{n+1}, трансверсально пересекающая M^n ровно в одной точке. 2) В случае односвязного многообразия N^{n+1} существует гладкое отображение $g : D^2 \to N^{n+1}$, ограничение которого на ∂D^2 совпадает с $\tilde{\gamma}$. 3) В общем положении пересечение $f(M^n)$, $g(D^2)$ и $\tilde{\gamma}$ состоит из чётного числа точек.)