

Производный функтор

Сегодняшняя наша цель – по функтору между абелевыми категориями построить функтор на производных категориях, обладающий хорошими свойствами. В частности, производный функтор содержит в себе информацию о всех классических производных функторах.

Пусть \mathcal{A} и \mathcal{B} – абелевы категории, а $F: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ – аддитивный функтор. Почленное применение F задаёт функтор $\text{Kom}(\mathcal{A}) \rightarrow \text{Kom}(\mathcal{B})$. Кроме того, почленное применение F переводит гомотопные морфизмы в гомотопные, а значит, задаёт функтор $\text{K}(\mathcal{A}) \rightarrow \text{K}(\mathcal{B})$ на гомотопических категориях. Эти функторы мы также обозначим через F .

Естественное пожелание к функтору $\mathcal{D}F$ на производных категориях такое: включаться в коммутативную диаграмму

$$(1) \quad \begin{array}{ccc} \text{Kom}(\mathcal{A}) & \xrightarrow{F} & \text{Kom}(\mathcal{B}) \\ \downarrow Q & & \downarrow Q \\ \mathcal{D}(\mathcal{A}) & \xrightarrow{\mathcal{D}F} & \mathcal{D}(\mathcal{B}). \end{array}$$

Нетрудно видеть, что для точного F такой $\mathcal{D}F$ существует. Действительно, $QF: \text{Kom}(\mathcal{A}) \rightarrow \mathcal{D}(\mathcal{B})$ переводит квазизоморфизмы в изоморфизмы и поэтому пропускается через $\mathcal{D}(\mathcal{A})$.

Однако для функтора F , не являющегося точным, такого $\mathcal{D}F$ существовать не может. Действительно, почленное применение F к двум квазизоморфным комплексам (т.е. изоморфным в $\mathcal{D}(\mathcal{A})$ объектам) должно давать изоморфные объекты (т.е. квазизоморфные комплексы). Но для не точного F существует комплекс $0 \rightarrow K \rightarrow L \rightarrow M \rightarrow 0$, квазизоморфный нулю и такой, что комплекс $0 \rightarrow F(K) \rightarrow F(L) \rightarrow F(M) \rightarrow 0$ уже не будет квазизоморфен нулю.

Всё, что можно пытаться сделать, – это построить приближения к функтору $\mathcal{D}F$, замыкающему диаграмму. Как обычно, можно рассматривать два случая – приближения слева и справа. Мы предположим, что F точен справа, и будем строить приближения слева. Идея остаётся той же, что и при построении классических производных функторов, – надо применять функтор F не ко всем комплексам, а только к комплексам специального вида.

Предположим, что в \mathcal{A} достаточно много проективных объектов. В этом случае естественно рассмотреть ограниченную справа производную категорию – тогда у любого объекта будет проективная резольвента. Более того, она функториальна на производной категории.

Лемма 1. *Пусть в абелевой категории \mathcal{A} достаточно много проективных объектов. Тогда сопоставление комплексу его проективной резольвенты задаёт функтор*

$$P: \mathcal{D}^-(\mathcal{A}) \rightarrow \text{K}^-(\text{Proj}\mathcal{A}).$$

Доказательство. Зафиксируем для каждого $K^\bullet \in \text{Kom}^-(\mathcal{A})$ проективную резольвенту $P(K)^\bullet \xrightarrow{p(K)} K^\bullet$. Морфизму $f: K^\bullet \rightarrow L^\bullet$ в $\mathcal{D}(\mathcal{A})$ соответствует морфизм

$$p(L)^{-1}fp(K): P(K)^\bullet \rightarrow P(L)^\bullet$$

в $\mathcal{D}(\mathcal{A})$, который задаётся единственным морфизмом $P(f): P(K)^\bullet \rightarrow P(L)^\bullet$ в гомотопической категории комплексов. Из его единственности следует, что соответствие $f \mapsto P(f)$ сохраняет композицию. \square

Теперь можно определить производный функтор $LF: \mathcal{D}^-(\mathcal{A}) \rightarrow \mathcal{D}^-(\mathcal{B})$ на производных категориях, применяя F почленно к проективной резольвенте заданного комплекса. Точнее, положим

$$LF(K^\bullet) = F(P(K)^\bullet),$$

где $P(K)^\bullet$ – фиксированная проективная резольвента K^\bullet . Функтор P взятия проективной резольвенты сопоставляет морфизму-домику f между комплексами настоящий морфизм $P(f)$ между их резольвентами, что позволяет определить LF на морфизмах:

$$LF(f) = F(P(f)).$$

В действительности, мы определили LF как композицию функторов P и $F: K^-(\mathcal{A}) \rightarrow K^-(\mathcal{B})$. Построенный функтор $LF: \mathcal{D}^-(\mathcal{A}) \rightarrow \mathcal{D}^-(\mathcal{B})$ называется *левым производным функтором* от F .

Чем же хорош производный функтор? Во-первых, с его помощью можно вычислять классические производные функторы:

Предложение 2. *Пусть $F: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ – точный справа функтор, а в \mathcal{A} достаточно много проективных объектов. Тогда*

$$L_i F(M) = H_i(LF(M[0])).$$

Доказательство. Очевидно. □

Отметим, что производный функтор несёт больше информации, чем набор классических производных функторов: комплекс $LF(M[0])$ не определяется, вообще говоря, набором своих когомологий.

Во-вторых, имеется аналог длинной точной последовательности производных функторов. Точнее говоря, левый производный функтор от точного справа функтора на абелевых категориях становится точным функтором на производных категориях.

Точным функтором между триангулированными категориями называется аддитивный функтор $F: \mathcal{T} \rightarrow \mathcal{S}$ вместе с фиксированным изоморфизмом $\varepsilon: F \circ [1]_{\mathcal{T}} \rightarrow [1]_{\mathcal{S}} \circ F$ такой, что для любого выделенного треугольника

$$X \rightarrow Y \rightarrow Z \xrightarrow{h} X[1]_{\mathcal{T}}$$

в \mathcal{T} треугольник

$$F(X) \rightarrow F(Y) \rightarrow F(Z) \xrightarrow{h'} F(X)[1]_{\mathcal{S}}$$

выделен в \mathcal{S} , где морфизм h' есть композиция $F(Z) \xrightarrow{F(h)} F(X[1]_{\mathcal{T}}) \xrightarrow{\varepsilon(X)} F(X)[1]_{\mathcal{S}}$. Говоря проще, точный функтор – это функтор, сохраняющий сдвиг и выделенные треугольники.

Уже известные нам примеры точных функторов между триангулированными категориями – это локализация $Q: K(\mathcal{A}) \rightarrow \mathcal{D}(\mathcal{A})$, а также любая локализация триангулированной категории по классу морфизмов, удовлетворяющему условиям прошлой лекции. Кроме того, точным будет функтор между гомотопическими категориями $F: K(\mathcal{A}) \rightarrow K(\mathcal{B})$, построенный выше. Ясно также, что композиция точных функторов точна. Примеры разумных, но не точных функторов – это функторы левого и правого обрезания комплексов.

Предложение 3. *Пусть $F: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ – точный справа функтор, а в \mathcal{A} достаточно много проективных объектов. Тогда производный функтор $LF: \mathcal{D}^-(\mathcal{A}) \rightarrow \mathcal{D}^-(\mathcal{B})$ точный.*

Доказательство. Достаточно проверить, что функтор P взятия проективной резольвенты точен. Полезно применить небольшую хитрость: в определении производного функтора выбрать проективные резольвенты так, чтобы у комплексов, отличающихся на сдвиг, резольвенты также отличались бы на сдвиг. Тогда функтор P будет в точности коммутирувать с функтором сдвига, и в качестве ε возьмём тождественный морфизм. Теперь покажем, что P переводит выделенные треугольники в выделенные, достаточно это сделать для стандартных треугольников вида $K^\bullet \xrightarrow{f} L^\bullet \rightarrow C(f) \rightarrow K[1]^\bullet$. Рассмотрим коммутативную диаграмму

$$\begin{array}{ccccccc}
 P(K)^\bullet & \xrightarrow{P(f)} & P(L)^\bullet & \longrightarrow & C(P(f)) & \longrightarrow & P(K)[1]^\bullet \\
 \downarrow p(K) & & \downarrow p(L) & & \downarrow w & & \downarrow p(K)[1] \\
 K^\bullet & \xrightarrow{f} & L^\bullet & \longrightarrow & C(f) & \longrightarrow & K[1]^\bullet \\
 \uparrow p(K) & & \uparrow p(L) & & \uparrow p(C(f)) & & \uparrow p(K)[1] \\
 P(K)^\bullet & \xrightarrow{P(f)} & P(L)^\bullet & \longrightarrow & P(C(f)) & \longrightarrow & P(K)[1]^\bullet
 \end{array}$$

В ней верхняя строка – выделенный треугольник по определению, а морфизм w строится по аксиоме TR3, причём является квазизоморфизмом по доказанному. Диаграмма показывает, что верхняя и нижняя строки изоморфны в $\mathcal{D}(\mathcal{A})$. А значит, они изоморфны и в $\mathbf{K}(\mathcal{A})$, так как все шесть в них входящих комплексов – ограниченные справа проективные, а функтор $\mathbf{K}^-(\mathrm{Proj}(\mathcal{A})) \rightarrow \mathcal{D}(\mathcal{A})$ строго полон. Получили, что нижняя строка изоморфна в $\mathbf{K}^-(\mathcal{A})$ выделенному треугольнику и следовательно, тоже выделена. \square

Напомним следующий факт.

Задача 1. Любую точную тройку комплексов $0 \rightarrow K^\bullet \xrightarrow{f} L^\bullet \xrightarrow{g} M^\bullet \rightarrow 0$ можно дополнить до выделенного треугольника в производной категории.

Из предложения 3 и задачи 1 вытекает существование длинной точной последовательности производных функторов. Действительно, если $0 \rightarrow K \rightarrow L \rightarrow M \rightarrow 0$ – точная тройка, то имеются выделенные треугольники $K[0] \rightarrow L[0] \rightarrow M[0] \rightarrow K[1]$ и $LF(K[0]) \rightarrow LF(L[0]) \rightarrow LF(M[0]) \rightarrow LF(K[1])$. Переходя в последнем к когомологиям, получаем длинную точную последовательность классических производных функторов.

Говорят, что точный справа функтор $F: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ имеет *когомологическую размерность* n , если $n = \max\{k \mid L_k F \neq 0\}$. Для функтора конечной когомологической размерности производный функтор можно определить и между ограниченными производными категориями. А именно, ограничивая LF на $\mathcal{D}^b(\mathcal{A})$, мы получим функтор, принимающий значения в $\mathcal{D}^b(\mathcal{B})$.

Для $I \subset \mathbb{Z}$ обозначим через $\mathrm{Kom}^I(\mathcal{A})$ категорию комплексов K^\bullet над \mathcal{A} , для которых $H^i(K^\bullet) = 0$ при $i \notin I$.

Лемма 4. Пусть $F: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ – точный справа функтор между абелевыми категориями, пусть когомологическая размерность F равна n . Тогда для $K^\bullet \in \mathrm{Kom}^{[a,b]}(\mathcal{A})$ мы имеем $LF(K^\bullet) \in \mathrm{Kom}^{[a-n,b]}(\mathcal{B})$.

Доказательство. Индукция по $b - a$. База: комплекс, квазизоморфный комплексу вида $M[-a]$, для которого утверждение следует из определения когомологической размерности. Переход индукции основан на следующем факте, вытекающем из леммы . \square

Лемма 5. Пусть K^\bullet – комплекс. Тогда в производной категории имеется выделенный треугольник

$$\tau_{\leq n} K^\bullet \rightarrow K^\bullet \rightarrow \tau_{\geq n+1} K^\bullet \rightarrow (\tau_{\leq n} K)[1]^\bullet.$$

Из доказанного вытекает

Предложение 6. Пусть $F: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ – точный справа функтор конечной когомологической размерности. Тогда корректно определён функтор $LF: \mathcal{D}^b(\mathcal{A}) \rightarrow \mathcal{D}^b(\mathcal{B})$, включающийся в коммутативную диаграмму

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{D}^b(\mathcal{A}) & \longrightarrow & D^-(\mathcal{A}) \\ \downarrow LF & & \downarrow LF \\ \mathcal{D}^b(\mathcal{B}) & \longrightarrow & D^-(\mathcal{B}). \end{array}$$

Как мы говорили, левый производный функтор – это приближение к (несуществующему) функтору $\mathcal{D}F$, делающему коммутативную диаграмму (1). Наша цель – объяснить, что именно это значит, и тем самым дать абстрактное определение производного функтора. Ниже мы покажем, что построенный нами производный функтор – пример достаточно общей конструкции локализации функтора. Для этого понадобится ещё немногого изучить триангулированные категории.

Пусть \mathcal{T} – триангулированная категория. Полная подкатегория $\mathcal{S} \subset \mathcal{T}$ называется *триангулированной подкатегорией*, если она инвариантна относительно сдвигов [1] и $[-1]$, а также взятия конусов: любой морфизм $X \rightarrow Y$ в \mathcal{T} , для которого X и Y лежат в \mathcal{S} , можно дополнить до выделенного треугольника, у которого третья вершина Z лежит в \mathcal{S} .

Примеры: $\mathcal{D}^b(\mathcal{A})$ – триангулированная подкатегория в $\mathcal{D}^+(\mathcal{A})$ и в $\mathcal{D}^-(\mathcal{A})$, а $\mathcal{D}^+(\mathcal{A})$ и $\mathcal{D}^-(\mathcal{A})$ – триангулированные подкатегории в $\mathcal{D}(\mathcal{A})$. Подкатегория $K(\text{Proj}(\mathcal{A}))$ триангулированная в $K(\mathcal{A})$.

Для триангулированных категорий, помимо локализации, есть естественное понятие факторизации. Пусть $\mathcal{N} \subset \mathcal{T}$ – строгая (т.е. замкнутая относительно изоморфизмов) триангулированная подкатегория. Определим фактор \mathcal{T}/\mathcal{N} как решение универсальной задачи. А именно, как точный функтор $Q: \mathcal{T} \rightarrow \mathcal{T}/\mathcal{N}$, такой что $Q(\mathcal{N}) = 0$, и что любой другой точный функтор $F: \mathcal{T} \rightarrow \mathcal{T}'$, для которого $F(\mathcal{N}) = 0$, пропускается единственным образом через функтор $F': \mathcal{T}/\mathcal{N} \rightarrow \mathcal{T}'$. Из определения следует, что факторкатегория, если существует, единственна.

Покажем, что при сделанных предположениях факторкатегория всегда существует. Для этого определим класс морфизмов S в \mathcal{T} : морфизм $f \in S \Leftrightarrow$ конус f лежит в \mathcal{N} . В интересующем нас примере \mathcal{N} – подкатегория ациклических комплексов, а S – класс квазизоморфизмов. Для точного функтора $F: \mathcal{T} \rightarrow \mathcal{T}'$ условия “ $F(\mathcal{N}) = 0$ ” и “ $F(S)$ – изоморфизмы” равносильны. Поэтому локализация \mathcal{T} по S является факторкатегорией \mathcal{T} по \mathcal{N} . То, что $\mathcal{T}[S^{-1}]$ триангулированная, вытекает из следующей леммы.

Лемма 7. Класс S удовлетворяет условиям Оре и условиям согласованности с триангулированной структурой из прошлой лекции.

Доказательство. То, что S замкнуто относительно композиции, следует из аксиомы октаэдра. Остальные условия Оре проверяются точно так же, как для случая квазизоморфизмов.

Инвариантность S относительно сдвигов очевидна. Второе условие согласованности S с триангулированной структурой также проверяется при помощи аксиомы октаэдра. \square

Пусть $F: \mathcal{T} \rightarrow \mathcal{T}'$ – точный функтор, а $\mathcal{N} \subset \mathcal{T}$ – строгая триангулированная подкатегория. Если $F(\mathcal{N}) = 0$, то F единственным образом пропускается через факторкатегорию \mathcal{T}/\mathcal{N} (по определению): существует функтор $F': \mathcal{T}/\mathcal{N} \rightarrow \mathcal{T}'$ такой, что $F \cong F'Q$. В общем случае такого F' существовать не может, приближение к нему называется локализацией функтора. *Левой локализацией функтора F относительно подкатегории \mathcal{N}* называется точный функтор $LF: \mathcal{T}/\mathcal{N} \rightarrow \mathcal{T}'$ вместе с заданным морфизмом функторов $\lambda: LF \circ Q \rightarrow F$, удовлетворяющим универсальному свойству: для любого точного функтора $G: \mathcal{T}/\mathcal{N} \rightarrow \mathcal{T}'$ и морфизма функторов $\lambda': G \circ Q \rightarrow F$ существует единственный морфизм $\phi: G \rightarrow LF$ такой, что $\lambda' = \lambda \circ (\phi Q)$.

Несложно видеть, что задание точного функтора $\mathcal{T} \rightarrow \mathcal{T}'$ вида $G \circ Q$ равносильно заданию точного функтора $\mathcal{T} \rightarrow \mathcal{T}'$, обращающегося в ноль на \mathcal{N} . А задание морфизма функторов $G_1 \circ Q \rightarrow G_2 \circ Q$ такого вида равносильно заданию морфизма $G_1 \rightarrow G_2$. Поэтому универсальное свойство, определяющее локализацию, можно неформально выразить так: локализация – ближайший слева к F функтор, переводящий \mathcal{N} в ноль. В частности, если $F(\mathcal{N}) = 0$, то локализацией служит индуцированный функтор F' на факторкатегории.

Предложение 8. *Пусть $F: \mathcal{T} \rightarrow \mathcal{T}'$ – точный функтор, а $\mathcal{N} \subset \mathcal{T}$ – строгая триангулированная подкатегория. Предположим, что вложение $\mathcal{N} \rightarrow \mathcal{T}$ имеет левый сопряжённый функтор. Тогда F имеет левую локализацию.*

Перед доказательством нужно понять, что означает условие о существовании у вложения сопряжённого функтора. Дадим ещё несколько определений.

Пусть $\mathcal{U} \subset \mathcal{T}$ – подкатегория. *Правым ортогоналом* к \mathcal{U} называется полная подкатегория $\mathcal{U}^\perp \subset \mathcal{T}$, образованная объектами $X \in \mathcal{T}$, для которых $\text{Hom}(U, X[i]) = 0$ при всех $U \in \mathcal{U}$ и $i \in \mathbb{Z}$. Аналогично определяется ${}^\perp\mathcal{U}$ – левый ортогонал к \mathcal{U} . Несложно убедиться в том, что ортогонал – триангулированная подкатегория, замкнутая относительно изоморфизмов.

Пусть \mathcal{U}, \mathcal{V} – две подкатегории в \mathcal{T} такие, что $\text{Hom}(V, U) = 0$ для любых $U \in \mathcal{U}, V \in \mathcal{V}$. Пусть для любого $X \in \mathcal{T}$ существует выделенный треугольник $V \rightarrow X \rightarrow U \rightarrow V[1]$, у которого $U \in \mathcal{U}, V \in \mathcal{V}$. Тогда говорят, что имеется *полуортогональное разложение* $\mathcal{T} = \langle \mathcal{U}, \mathcal{V} \rangle$.

Основной для нас пример полуортогонального разложения – следующий. Пусть \mathcal{A} – абелева категория, где достаточно много проективных объектов. Тогда из доказанного ранее следует, что имеется полуортогональное разложение

$$\text{K}^-(\mathcal{A}) = \langle \text{Acycl}^-(\mathcal{A}), \text{K}^-(\text{Proj}(\mathcal{A})) \rangle,$$

где $\text{Acycl}^-(\mathcal{A})$ обозначает полную подкатегорию, состоящую из ациклических ограниченных справа комплексов.

Также мы видели, что имеются полуортогональные разложения (компоненты которых не триангулированы)

$$\mathcal{D}(\mathcal{A}) = \langle \mathcal{D}_{\geq n+1}(\mathcal{A}), \mathcal{D}_{\leq n}(\mathcal{A}) \rangle.$$

Лемма 9. *Пусть дано полуортогональное разложение $\mathcal{T} = \langle \mathcal{U}, \mathcal{V} \rangle$ на триангулированные подкатегории. Тогда*

1. *разложение $V \rightarrow X \rightarrow U \rightarrow V[1]$ единственно для любого объекта $X \in \mathcal{T}$;*
2. *соответствия $X \mapsto U$ и $X \mapsto V$ являются точными функторами, обозначим их $u^*: \mathcal{T} \rightarrow \mathcal{U}$ и $v_*: \mathcal{T} \rightarrow \mathcal{V}$;*

3. функтор u^* сопряжён слева к функтору вложения $\mathcal{U} \rightarrow \mathcal{T}$, а v_* сопряжён справа ко вложению $\mathcal{V} \rightarrow \mathcal{T}$.

Верно и обратное:

Лемма 10. Пусть $\mathcal{U} \subset \mathcal{T}$ – триангулированная подкатегория, для которой функтор вложения и имеет левый сопряжённый. Тогда имеется полуортогональное разложение $\mathcal{T} = \langle \mathcal{U}, \perp \mathcal{U} \rangle$. Аналогичное верно для подкатегории, вложение которой имеет правый сопряжённый функтор.

Задача 2. Докажите эти леммы.

Доказательство предложения 8. Пусть $\mathcal{P} =^\perp \mathcal{N}$ – левый ортогонал к \mathcal{N} . Имеем полуортогональное разложение $\mathcal{T} = \langle \mathcal{N}, \mathcal{P} \rangle$. Обозначим вложение $\mathcal{P} \rightarrow \mathcal{T}$ через β , а правый сопряжённый к нему функтор через β_* . Пусть $\varepsilon: \beta\beta_* \rightarrow 1_{\mathcal{T}}$ – коединица сопряжения. Определим морфизм функторов $\bar{F} = F\beta\beta_* \rightarrow F$ как $F\varepsilon$. Так как $\beta_*\mathcal{N} = 0$, то $\bar{F}(\mathcal{N}) = 0$. Значит функтор \bar{F} имеет вид $LF \circ Q$, где $LF: \mathcal{T}/\mathcal{N} \rightarrow \mathcal{T}'$ – некоторый точный функтор. Тем самым морфизм $\lambda: LF \circ Q \rightarrow F$ построен. Покажем, что LF – локализация. Пусть задан морфизм функторов $\lambda': G \circ Q \rightarrow F$. Рассмотрим коммутативную диаграмму

$$\begin{array}{ccc} GQ & \xrightarrow{\lambda'} & F \\ GQ\varepsilon \parallel & \searrow & \uparrow F\varepsilon \\ GQ\beta\beta_* & \xrightarrow{\lambda'\beta\beta_*} & F\beta\beta_* = LF \circ Q. \end{array}$$

В ней $GQ\varepsilon$ – изоморфизм функторов. Действительно, для любого объекта $X \in \mathcal{T}$ имеем выделенный треугольник $\beta\beta_*X \xrightarrow{\varepsilon(X)} X \rightarrow X' \rightarrow \beta\beta_*X[1]$, где $X' \in \mathcal{N}$, применяя GQ , получаем, что $GQ(X') = 0$ и $GQ\varepsilon(X)$ – изоморфизм. Получаем существование (единственного) морфизма $GQ \rightarrow LF \circ Q$, который очевидно имеет вид ϕQ , где $\phi: G \rightarrow LF$ – некоторый морфизм. \square

Следствие 11. Пусть $F: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ – точный справа функтор, а в \mathcal{A} достаточно много проективных объектов. Обозначим локализации $K^-(\mathcal{A}) \rightarrow \mathcal{D}^-(\mathcal{A})$ и $K^-(\mathcal{B}) \rightarrow \mathcal{D}^-(\mathcal{B})$ через Q . Тогда для производного функтора $LF: \mathcal{D}^-(\mathcal{A}) \rightarrow \mathcal{D}^-(\mathcal{B})$ имеется морфизм функторов $LF \circ Q \rightarrow QF$ и выполнено универсальное свойство: для любого точного функтора $G: \mathcal{D}^-(\mathcal{A}) \rightarrow \mathcal{D}^-(\mathcal{B})$ любой морфизм функторов $GQ \rightarrow QF$ единственным образом проносится через морфизм функторов $G \rightarrow LF$.

Доказательство. Это – частный случай предыдущего предложения. Пусть $\mathcal{T} = K^-(\mathcal{A})$, $\mathcal{T}' = \mathcal{D}^-(\mathcal{B})$, в качестве $F: \mathcal{T} \rightarrow \mathcal{T}'$ возьмём композицию QF . Пусть $\mathcal{N} \subset \mathcal{T}$ – полная строгая подкатегория, образованная ациклическими комплексами. Факторкатегория \mathcal{T} по \mathcal{N} – это в точности локализация \mathcal{T} по квазизоморфизмам, т.е. $\mathcal{D}^-(\mathcal{A})$. Имеется полуортогональное разложение $K^-(\mathcal{A}) = \langle \text{Acycl}^-(\mathcal{A}), K^-(\text{Proj}(\mathcal{A})) \rangle$, и следовательно вложение \mathcal{N} имеет левый сопряжённый функтор. Ортогональная подкатегория $\mathcal{P} =^\perp \mathcal{N}$ – это подкатегория комплексов с проективными членами. Сопряжённый функтор β_* – сопоставление комплексу K^\bullet его проективной резольвенты $P(K)^\bullet$, а коединица сопряжения – соответствующий морфизм $P(K)^\bullet \rightarrow K^\bullet$. Поэтому локализация, построенная в доказательстве предложения 8, совпадает с производным функтором LF , как он был определён нами раньше. А значит, LF является локализацией функтора и удовлетворяет универсальному свойству. \square

Способ строить производные функторы при помощи полуортогонального разложения на самом деле очень сильный. При некоторых условиях на абелеву категорию он позволяет построить производные функторы на неограниченной производной категории. Следующая конструкция принадлежит Н.Спалтенштейну.

Комплекс K^\bullet над \mathcal{A} назовём *H-проективным*, если $\text{Hom}_{K(\mathcal{A})}(K^\bullet, N^\bullet) = 0$ для любого ациклического комплекса N^\bullet . Аналогично, комплекс K^\bullet над \mathcal{A} назовём *H-инъективным*, если для любого ациклического комплекса N^\bullet имеем $\text{Hom}_{K(\mathcal{A})}(N^\bullet, K^\bullet) = 0$.

Как мы знаем, любой ограниченный справа комплекс с проективными членами H-проективен, при этом есть неограниченные комплексы с проективными членами, которые не являются H-проективными. Любая прямая сумма H-проективных комплексов H-проективна.

Если у любого комплекса над \mathcal{A} есть H-проективная резольвента, то выполнено условие предложения 8 и у любого функтора существует левый производный, определённый на $D(\mathcal{A})$. Следующая теорема даёт примеры того, когда это работает.

Теорема 12 (Спалтенштейн). 1. Пусть $\mathcal{A} = R\text{-Mod}$ – категория модулей над кольцом R . Тогда имеет место полуортогональное разложение

$$\text{K}(R\text{-Mod}) = \langle \text{Acycl}(\mathcal{A}), \text{H-Proj}(\mathcal{A}) \rangle$$

и, следовательно, любой функтор на $R\text{-Mod}$ имеет левый производный.

2. Пусть \mathcal{A} – категория пучков модулей над фиксированным пучком колец на топологическом пространстве. Тогда имеет место полуортогональное разложение

$$\text{K}(\mathcal{A}) = \langle \text{H-Inj}(\mathcal{A}), \text{Acycl}(\mathcal{A}) \rangle$$

и, следовательно, любой функтор на \mathcal{A} имеет правый производный.