

Листок 4

Пусть (Ω, \mathcal{F}, P) — пространство Ω с заданной на нем σ -алгеброй \mathcal{F} и мерой P , такой что $P(\Omega) = 1$. Пусть $T : \Omega \rightarrow \Omega$ — эргодическое преобразование. Пусть задана интегрируемая функция $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, и обозначим символом a ее математическое ожидание: $a = \int f(x)dP(x)$. Простой вариант эргодической теоремы может быть сформулирован следующим образом

Эргодическая теорема. Для почти всех точек $w \in \Omega$ выполнено

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f(T^k w) = a.$$

Доказательство эргодической теоремы можно найти в многих книгах, например, в П. Р. Халмош, “Лекции по эргодической теории” или в П. Биллингслей, “Эргодическая теория и информация”.

При решении задач этого листка разрешается пользоваться эргодической теоремой.

Задача 4.1. Докажите, что для любого $A \in \mathcal{F}$ почти любая точка x попадает в A с асимптотической частотой $P(A)$ (это означает, что среди точек $\{x, Tx, T^2x, \dots, T^n x\}$ доля тех, которые принадлежат A , стремится к $P(A)$).

Задача 4.2. Число $x \in [0; 1)$ называется *нормальным по основанию 2*, если в его двоичной записи $0.a_1a_2a_3\dots$ доля единиц среди первых n знаков стремится к $1/2$ при $n \rightarrow \infty$. Докажите, что почти все числа нормальны по основанию 2.

Задача 4.3. Число $x \in [0; 1)$ называется *нормальным по основанию k* , если доля любой “цифры” в его k -ичной записи стремится к $1/k$. Число $x \in [0; 1)$ называется *нормальным*, если оно нормально по любому основанию. Докажите, что почти все числа нормальны.

Задача 4.4. Докажите, что

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \{2^k x\} = \frac{1}{2}, \quad \text{для почти всех } x.$$

Задача 4.5. Пусть $f : [0; 1] \rightarrow \mathbb{R}$ — измеримая функция, и $f(x) > 0$ для всех x . Пусть $\alpha \in \mathbb{R}$. Докажите, что

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^{n-1} f(\{x + k\alpha\}) = \infty, \quad \text{для почти всех } x.$$

и найдите предел

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f(\{x + k\alpha\})$$

для различных α .

Последовательность чисел $\{a_1, a_2, \dots, a_n, \dots\}$, $a_i \in [0, 1)$, называется *равномерно распределенной*, если для любого интервала (a, b) доля точек из последовательности, лежащих в этом интервале, стремится к $b - a$.

Задача 4.6. Докажите, что при иррациональном α для любого $x \in [0, 1)$ последовательность $\{x + n\alpha\}$ равномерно распределена.

Задача 4.7. Пусть A_n — первая цифра числа 2^n (например, первые члены этой последовательности: 1, 2, 4, 8, 1, 3, 6, 1 ...). Пусть $p_k(n)$ — число элементов равных k среди первых n чисел этой последовательности, $k = 1, \dots, 9$. Докажите, что пределы $\lim_{n \rightarrow \infty} p_k(n)/n$ существуют и найдите их.