Лекция 4. Компактность

Теперь, когда у нас есть строгое определение действительных чисел, вернемся на время к абстрактной топологии.

Определение 4.1. Топологическое пространство X называется *компактным,* если оно обладает следующим свойством: во всяком семействе открытых подмножеств $\{U_\alpha\}$ таком, что $X = \bigcup_\alpha U_\alpha$ существует такое конечное подсемейство $\{\alpha_1, \ldots, \alpha_n\}$, что $X = U_{\alpha_1} \cup \cdots \cup U_{\alpha_n}$ (кратко эту мысль выражают так: из всякого открытого покрытия можно выбрать конечное подпокрытие).

Подмножество Y в топологическом пространстве X называется компактным, если оно компактно в топологии, индуцированной с X.

Пример 4.2. Всякое компактное подмножество $M \subset \mathbb{R}$ обязано быть ограниченным. В самом деле, для всякого $i \in \mathbb{Z}$ рассмотрим открытое в M множество $U_i = (i-1; i+1) \cap M$. Ясно, что $M = \bigcup_{i\in\mathbb{Z}} U_i$, и что неограниченное множество M не может быть объединением конечного подсемейства этого семейства.

Пример 4.3. Интервал $(0;1) \subset \mathbb{R}$ ограничен, но компактным все же не является: имеем $(0;1) = \bigcup_{n>2}(1/n; 1-1/n)$, и конечного подпокрытия из этого покрытия не выберешь.

Приведем теперь позитивный пример.

Предложение 4.4. *Всякий отрезок $[a;b] \subset \mathbb{R}$ компактен.*

Это предложение иногда называют леммой Гейне-Бореля.

Доказательство. Пусть $[a;b] = \bigcup_\alpha U_\alpha$ — открытое покрытие. Положим

$$X = \{\, x \in (a;b] \mid \text{Отрезок } [a;x] \text{ покрыт конечным числом множеств } U_\alpha \,\}.$$

Заметим, что $X \neq \varnothing$: в самом деле, пусть $a \in U_{\alpha_0}$, тогда $[a; a+\varepsilon) \subset U_{\alpha_0}$ для некоторого $\varepsilon > 0$, и, скажем, отрезок $[a; a+\varepsilon/2]$ покрыт всего лишь одним множеством из нашего семейства.

Далее, пусть $\xi = \sup X$; покажем, что $\xi \in X$. В самом деле, пусть $\xi \in U_\beta$. Тогда предложение 3.15 показывает, что существует точка $c \in U_\beta \cap X$; по определению множества X имеем $[a;c] \subset U_{\alpha_1} \cup \cdots \cup U_{\alpha_n}$ для каких-то $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$; тогда $[a;\xi] \subset U_{\alpha_1} \cup \cdots \cup U_{\alpha_n} \cup U_\beta$, так что $\xi \in X$.

Покажем, наконец, что $\xi = b$. В самом деле, пусть $\xi \in U_\beta$; если $\xi < b$, то имеем $(\xi - \varepsilon; \xi + \varepsilon) \subset U_\beta$ для некоторого $\varepsilon > 0$. Тогда, добавляя, если надо, множество U_β к конечному семейству множеств U_α, покрывающих $[a;\xi]$, получаем, что, скажем, $\xi + \varepsilon/2 \in X$, в противоречие с тем, что $\xi = \sup X$.

Коль скоро $\xi = b$, отрезок $[a;b]$ покрыт конечным числом множеств U_α, что и требовалось доказать. □

Чтобы понять интуитивный смысл компактности, с ней надо немного поработать. Для начала — несколько простых свойств.

Предложение 4.5. *Пусть X — компактное топологическое пространство и $Y \subset X$ — его замкнутое подмножество. Тогда Y компактно.*

Доказательство. Согласно определению индуцированной топологии, задать открытое покрытие множества Y — все равно, что задать такое семейство открытых подмножеств $U_\alpha \subset X$, что $Y \subset \bigcup_\alpha U_\alpha$. Добавив к этому семейству открытое множество $X \setminus Y$, получим открытое покрытие X. Ввиду компактности X некоторое конечное подсемейство этого покрытия также покрывает X. Выбросим из этого подсемейства множество $X \setminus Y$, если оно там есть; оставшиеся множества $U_{\alpha_1}, \ldots, U_{\alpha_n}$ обязаны покрывать Y, что и требовалось. □

Чуть менее тривиально доказывается следующий факт:

Предложение 4.6. *Пусть X — хаусдорфово пространство и $K \subset X$ — его компактное подмножество. Тогда K замкнуто в X.*

Доказательство. Ввиду предложения 2.4 достаточно показать, что для всякой точки $z \notin K$ существует открытое $V \ni x$ такое, что $V \cap K = \varnothing$. В самом деле, ввиду отделимости X для каждой точки $x \in K$ найдутся такие открытые подмножества $U_x \ni x$ и $V_x \ni z$, что $U_x \cap V_x = \varnothing$. Имеем, очевидно, $K = \bigcup_{x \in K} U_x$; ввиду компактности K имеем $K \subset U_{x_1} \cup \cdots \cup U_{x_n}$ для некоторого конечного множества $\{x_1, \ldots, x_n\}$; тогда открытое множество $V = V_{x_1} \cap \cdots \cap V_{x_n}$ содержит z и не пересекается с K, что и требовалось. □

Из доказанных предложений вытекает конкретное описание компактных подмножеств $\mathbb{R}$:

Следствие 4.7. *Подмножество $X \subset \mathbb{R}$ компактно тогда и только тогда, когда оно замкнуто и ограничено.*

Доказательство. «Тогда» следует из предложений 4.4 и 4.5, а «только тогда» — из предложения 4.6 и примера 4.2. □

Следующее простое свойство компактных пространств выглядит так:

Предложение 4.8. *Пусть $f\colon X \to Y$ — непрерывное отображение топологических пространств, причем X компактно. Тогда подмножество $f(X) \subset Y$ компактно.*

Доказательство. Пусть $f(X) \subset \bigcup U_\alpha$, где все U_α открыты в Y. Тогда $X = \bigcup f^{-1}(U_\alpha)$, где все $f^{-1}(U_\alpha)$ открыты в X ввиду непрерывности f. Так как X компактно, имеем $X = f^{-1}(U_{\alpha_1}) \cup \cdots \cup f^{-1}(U_{\alpha_n})$ для каких-то $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ю Отсюда $f(X) = U_{\alpha_1} \cup \cdots \cup U_{\alpha_n}$, что и требовалось. □

Сопоставляя только что доказанное предложение с предложением 4.6, получаем такое

Следствие 4.9. *Пусть $f\colon X \to Y$ — непрерывное отображение топологических пространств, причем X компактно, а Y хаусдорфово. Тогда f переводит замкнутые подмножества X в замкнутые подмножества Y.*

Предложение 4.8 имеет также такое конкретное следствие:

Следствие 4.10. *Пусть $f\colon X \to \mathbb{R}$ — непрерывная функция на компактном пространстве X. Тогда f достигает на X наибольшего и наименьшего значения.*

Доказательство. Ввиду предложений 4.8 и 4.7, множество $f(X) \subset \mathbb{R}$ ограничено (стало быть, у него есть точная верхняя и точная нижняя грани) и замкнуто (стало быть, его верхняя и нижняя грани принадлежат $f(X)$ и тем самым являются его наибольшим и наименьшим элементами). □

Еще более конкретизируя, получаем

Следствие 4.11. *Всякая непрерывная функция на отрезке $[a;b] \subset \mathbb{R}$ достигает на нем наибольшего и наименьшего значения.*

Прежде, чем двигаться дальше, введем еще одно общее определение. Напомним, что *прямым произведением* (или декартовым произведением) множеств X и Y называется множество всех упорядоченных пар $(x;y)$, где $x \in X$, а $y \in Y$.

Определение 4.12. Пусть X и Y — топологические пространства. *Топологией произведения* на их прямом произведении $X \times Y$ называется топология, порожденная базой открытых множеств вида $U \times V \subset X \times Y$, где $U \subset X$ и $V \subset Y$ — произвольные открытые подмножества.

Разумеется, надо проверить, что указанный набор подмножеств в $X \times Y$ действительно является базой открытых множеств (проверка тривиальна — проделайте ее).

Аналогично определяется топология на прямом произведении произвольного конечного числа пространств (топология на произведении бесконечного семейства пространств определяется иначе — см. листки к семинарам).

Пример 4.13. Проверьте самостоятельно, что топология на $\mathbb{R}^n$ является произведением n экземпляров пространства $\mathbb{R}$ со стандартной топологией (указание: воспользуйтесь L^∞-метрикой).

Предложение 4.14. *Пусть X и Y — компактные топологические пространства. Тогда произведение $X \times Y$ также компактно.*

Доказательство. Ясно, что достаточно найти конечное подпокрытие в покрытии пространства $X \times Y$ открытыми подмножествами вида $U_\alpha \times V_\alpha$, где U_α — открытое подмножество в X, а V_α — открытое подмножество в Y. Далее, для всякой точки $x \in X$ подмножество $\{x\} \times Y \subset X \times Y$ естественно отождествляется с Y (паре $(x; y)$ соответствует $y \in Y$); легко видеть, что при этом отождествлении индуцированная с $X \times Y$ топология на $\{x\} \times Y$ переходит в исходную топологию на Y. Возвращаясь к нашему покрытию $X \times Y$ множествами вида $U_\alpha \times V_\alpha$, отметим, что, ввиду компактности Y и только что сделанного замечания, для всякой точки $x \in X$ существуют такие $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$, что $\{x\} \times Y \subset U_{\alpha_1} \times V_{\alpha_1} \cup \cdots \cup U_{\alpha_n} \times V_{\alpha_n}$. Положим $U_x = U_{\alpha_1} \cap \cdots \cap U_{\alpha_n}$; тогда $U_x \times Y \subset U_{\alpha_1} \times V_{\alpha_1} \cup \cdots \cup U_{\alpha_n} \times V_{\alpha_n}$. Теперь заметим, что $X = \bigcup_{x \in X} U_x$; ввиду компактности X, существуют такие $x_1, \ldots, x_m$, что $X = U_{x_1} \cup \cdots \cup U_{x_m}$. Стало быть, $X \times Y = (U_{x_1} \times Y) \cup \cdots \cup (U_{x_m} \times Y)$; тем самым $X \times Y$ является объединением конечного числа подмножеств, каждое из которых покрыто конечным числом множеств нашего покрытия. Следовательно, само $X \times Y$ также покрывается конечным числом множеств нашего покрытия. □

Доказанное предложение также имеет конкретные следствия. Сначала —

Определение 4.15. *Параллелотопом* называется множество вида

$$\{\, (x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid a_1 \leqslant x_1 \leqslant b_1, \ldots, a_n \leqslant x_n \leqslant b_n \,\}$$

(подразумевается, что $a_i < b_i$ для всех i).

Обещанное следствие имеет вид:

Следствие 4.16. *Всякий параллелотоп в $\mathbb{R}^n$ компактен.* □

Из этого вытекает также такой аналог предложения 4.7:

Следствие 4.17. *Подмножество $X \subset \mathbb{R}^n$ компактно тогда и только тогда, когда оно замкнуто и ограничено.* □

По определению, подмножество $X \subset \mathbb{R}^n$ называется ограниченным, если все координаты его точек ограничены (иными словами, если X содержится в некотором параллелотопе).

Для метрических пространств существует еще одна, пожалуй, более наглядная характеризация компактности. Начнем с такого простого факта:

Предложение-определение 4.18. Пусть $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ — последовательность точек в метрическом пространстве X и $a \in X$. Тогда следующие условия эквивалентны:

1) Существует подпоследовательность последовательности $\{x_n\}$, сходящаяся к a.

2) Для любого $\varepsilon > 0$ существует бесконечно много таких $n \in \mathbb{N}$, что $x_n \in B_\varepsilon(a)$.

При выполнении этих условий говорят, что точка a является *предельной точкой* последовательности $\{x_n\}$.

Проверку эквивалентности двух условий можно спокойно предоставить читателю.

Теперь сформулируем свойство метрических пространств, которое окажется эквивалентным компактности.

Определение 4.19. Метрическое пространство называется *секвенциально компактным,* если всякая последовательность его точек имеет предельную точку.

Неформально говоря, в секвенциально компактном пространстве последовательность не может быть «всюду разреженной».

Основная теорема о компактных метрических пространствах гласит следующее:

Теорема 4.20. *Метрическое пространство $(X;\rho)$ компактно тогда и только тогда, когда оно секвенциально компактно.*

Доказательство. Начнем с более простой части «только тогда». Пусть X компактно. Если ни одна точка $a \in X$ не является предельной точкой последовательности $\{x_n\}$, то для всякой $a \in X$ существует такое открытое множество $U_a \ni a$, что лишь для конечного числа натуральных чисел n может выполняться включение $x_n \in U_a$. Ввиду компактности X имеем $X = U_{a_1} \cup \cdots \cup U_{a_m}$ для каких-то $a_1, \ldots, a_m \in X$, так что лишь для конечного числа натуральных чисел n может выполняться включение $x_n \in X$, что нелепо.

Для доказательства «тогда» нам понадобится одна лемма, полезная и сама по себе.

Лемма 4.21 (о лебеговом числе). *Для всякого открытого покрытия секвенциально компактного метрического пространства X существует такое число $\varepsilon > 0$, что для всякой точки $x \in X$ шар $B_\varepsilon(x)$ содержится в одном из множеств покрытия.*

Доказательство леммы. Предположим, что искомого «лебегова числа» не нашлось. Тогда для всякого $n \in \mathbb{N}$ найдется такая точка $x_n \in X$, что $B_{1/n}(x)$ не содержится ни в одном из множеств покрытия. Ввиду секвенциальной компактности из последовательности $\{x_n\}$ можно выбрать сходящуюся подпоследовательность. Стало быть, существуют последовательность точек $y_m \in X$, сходящаяся к точке $y \in X$, и последовательность положительных чисел ε_m, сходящаяся к нулю, такие, что для всякого $m \in \mathbb{N}$ шар $B_{\varepsilon_m}(y_m)$ не содержится ни в одном из множеств покрытия. Приведем эту ситуацию к противоречию.

В самом деле, имеем $y \in U$, где U — какое-то из множеств, входящих в покрытие. Так как U открыто, найдется такое $\varepsilon > 0$, что $B_\varepsilon(y) \subset U$. Пусть теперь натуральное число N таково, что при всех $m \geqslant N$ имеем $\rho(y_m, y) < \varepsilon/2$

и $|\varepsilon_m| < \varepsilon/2$. Тогда из неравенства треугольника немедленно вытекает, что при $m \geqslant N$ имеем $B_{\varepsilon_m}(y_m) \subset B_\varepsilon(y)$. Поскольку $B_\varepsilon(y)$ содержится в U, получаем противоречие с выбором чисел ε_m. □

Теперь можно завершить доказательство теоремы. Итак, пусть U_α — открытое покрытие секвенциально компактного метрического пространства X; нам нужно выбрать из него конечное подпокрытие. Ввиду леммы существует такое $\varepsilon > 0$, что для всякого $x \in X$ шар $B_\varepsilon(x)$ содержится в одном из U_α. Стало быть, достаточно выбрать конечное подпокрытие в покрытии $\bigcup_{x\in X} B_\varepsilon(x) = X$; этим мы сейчас и займемся.

Выберем произвольно точку $x_1 \in X$; если $B_\varepsilon(x_1) = X$, то требуемое подпокрытие (состоящее всего из одного множества) уже найдено; если нет, то возьмем произвольную $x_2 \in X \setminus B_\varepsilon(x_1)$; если $B_\varepsilon(x_1) | cup B_\varepsilon(x_2) \neq X$, то возьмем произвольную $x_3 \in X \setminus (B_\varepsilon(x_1) \cup B_\varepsilon(x_2))$, и т. д. Если этот процесс на каком-то шаге оборвется, мы получим искомое конечное покрытие пространства X множествами вида $B_\varepsilon(x)$; в противном случае мы получаем последовательность $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}$, обладающую тем свойством, что $\rho(x_m, x_n) \geqslant \varepsilon$ при $m \neq n$. Ясно, что ни эта последовательность, ни любая ее подпоследовательность не может быть даже фундаментальной, не говоря уж о том, чтобы иметь предел. Полученное противоречие с секвенциальной компактностью завершает доказательство. □

В заключение докажем еще одно полезное свойство компактных метрических пространств.

Теорема 4.22. *Всякое компактное метрическое пространство является полным.*

Излишне говорить, что обратное утверждение неверно (примеры: $\mathbb{R}$, $\mathbb{Q}_p$).

Доказательство. Пусть X — компактное метрическое пространство, и пусть $\{x_n\}$ — фундаментальная последовательность точек X. Нам надо доказать, что эта последовательность сходится. По только что доказанной теореме существует такая строго возрастающая последовательность натуральных чисел $\{n_k\}_{k\in\mathbb{N}}$, что $\lim_{k\to\infty} x_{n_k} = a$, где $a \in X$. Покажем, что и сама последовательность $\{x_n\}$ сходится к a.

В самом деле, зададимся числом $\varepsilon > 0$. Ввиду фундаментальности последовательности $\{x_n\}$ найдется такое $N \in \mathbb{N}$, что $\rho(x_m, x_n) < \varepsilon/2$, как только $m, n > N$; найдем такое $k \in \mathbb{N}$, что $n_k > N$ и $\rho(x_{n_k}, a) < \varepsilon/2$. Тогда для всякого $n > N$ имеем

$$\rho(x_n, a) \leqslant \rho(x_n, x_{n_k}) + \rho(x_{n_k}, a) < \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon,$$

что и требовалось. □