НМУ, 2 курс, дифференциальная геометрия. Листок 1.
Кривые в плоскости и пространстве. 13.02.2009.

Задача 1. Доказать, что кривизна плоской кривой $\mathbf{r}(t) = x(t)e_1 + y(t)e_2$, где t — произвольный параметр, может быть найдена

а) по формуле $k = \dfrac{|\ddot{x}\dot{y} - \ddot{y}\dot{x}|}{(\dot{x}^2 + \dot{y}^2)^{\frac{3}{2}}}$.

б) по формуле

$$k = \frac{|[\dot{\mathbf{r}}, \ddot{\mathbf{r}}]|}{|\dot{\mathbf{r}}|^3}, \tag{1}$$

где $[\mathbf{a}, \mathbf{b}]$ обозначает векторное произведение векторов $\mathbf{a}$ и $\mathbf{b}$.

Задача 2. Доказать, что при кривизна пространственной кривой $\mathbf{r}(t) = x(t)e_1 + y(t)e_2 + z(t)e_3$, где t — произвольный параметр, может быть найдена по формуле (1), а кручение — по формуле $\varkappa = \dfrac{(\dot{\mathbf{r}}, \ddot{\mathbf{r}}, \dddot{\mathbf{r}})}{|[\dot{\mathbf{r}}, \ddot{\mathbf{r}}]|^2}$.

Задача 3. Найти кривизну и кручение кривой $\mathbf{r}(t) = e^t(\sin t, \cos t, 1)$.

Задача 4. а) Доказать, что если кривизна кривой тождественно равна нулю, то это прямая.

б) Доказать, что если кручение кривой тождественно равно нулю, то эта кривая лежит в плоскости.

Задача 5. Доказать, что если кривая с $k \neq 0$, $\varkappa \neq 0$ лежит на сфере радиуса R, то

$$R^2 = \frac{1}{k^2}\left(1 + \frac{(k')^2}{(\varkappa k)^2}\right), \tag{2}$$

где $'$ обозначает производную по отношению к натуральному параметру. Доказать, что если ещё и $k' \neq 0$, то и обратное верно: из тождества (2) следует, что кривая лежит на некоторой сфере радиуса R.

Задача 6. Доказать, что кривая постоянной кривизны, лежащая на сфере, является окружностью.

Задача 7. Описать кривые с

а) постоянным кручением,

б) постоянными кривизной и кручением,

Задача 8*. Доказать, что выпуклая замкнутая гладкая плоская кривая имеет не менее 4 точек экстремума кривизны.

Задача 9. Доказать, что для замкнутой гладкой кривой $\int\limits_\gamma (\mathbf{r}\, dk - \varkappa \mathbf{b}\, ds) = 0$, где s — натуральный параметр.