НМУ, 2 курс, дифференциальная геометрия. Листок 9.
Римановы многообразия-I. 4.04.2011.

Задача 1. Доказать, что любая цилиндрическая поверхность локально изометрична плоскости. Доказать аналогичный факт для конических поверхностей.

Задача 2. Доказать, что геликоид $\mathbf{r}(u,v) = (u\sin v, u\cos v, av)$ и катеноид $\mathbf{R}(u,v) = \left(\sqrt{a^2+u^2}\cos v, \sqrt{a^2+u^2}\sin v, a\ln\dfrac{u+\sqrt{a^2+u^2}}{a}\right)$ локально изометричны.

Задача 3. Пусть e_i базис в векторных полях, e^i дуальный к нему базис. Рассмотрим сечение s расслоения $\xi = (E \longrightarrow M)$. Формулу $\nabla s = e^i \otimes \nabla_{e_i} s$, где $s \in \Gamma(M,E)$, для связности в расслоении ξ по ошибке иногда пишут как $\nabla s = e^i \wedge \nabla_{e_i} s$, но последняя формула неверна и *для произвольного расслоения ξ не имеет смысла!*

Но есть случай, когда операция $\nabla \wedge s := e^i \wedge \nabla_{e_i} s$ имеет смысл и тоже интересна. Пусть у нас есть симметричная связность ∇ в TM. Распространим эту связность в расслоение внешних форм. Пусть $s \in \Omega(M)$ дифференциальная форма на M. Рассмотрим операцию $\nabla \wedge s := e^i \wedge \nabla_{e_i} s$, где мы смотрим на s как на сечение расслоения ΛT^*M, а не как на форму со значениями в сечениях.

Доказать, что тогда $\nabla \wedge s = ds$, то есть это обычный внешний дифференциал формы s. Чему равно выражение $\nabla \wedge s$ для несимметричной связности ∇ в касательном расслоении TM?

Задача 4. Если ∇ связность в касательном расслоении TM, то она продолжается до связностей во всех тензорных расслоениях $T^p_q M$. Для простоты будем обозначать эти продолжения связности ∇ тем же символом ∇. Доказать, что связность ∇ согласована с метрикой $\langle\,,\rangle$ тогда и только тогда, когда $\nabla g = 0$, где g метрический тензор.

Задача 5. Найти явные формулы, выражающие компоненты тензора Римана $R^l_{ij,k}$ через символы Кристоффеля Γ^k_{ij}.

Задача 6. Доказать, что из-за многочисленных симметрий тензор Римана на двумерном многообразии полностью определяется своей компонентой $R^1_{12,2}$.

Задача 7. Доказать, что для симметричной связности ∇ имеет место тождество Бианки

$$(\nabla_X R)(Y,Z,V) + (\nabla_Y R)(Z,X,V) + (\nabla_Z R)(X,Y,V) = 0,$$

где X, Y, Z и V векторные поля. В компонентах это тождество имеет вид

$$\nabla_m R^l_{ij,k} + \nabla_i R^l_{jm,k} + \nabla_j R^l_{mi,k} = 0.$$

Задача 8. Для связности в касательном расслоении доказать следующие тождества:

- первое структурное уравнение Картана $de^i = e^j \wedge \Gamma^i_j + T^i$,
- второе структурное уравнение Картана

$$d\Gamma^j_i = \Gamma^k_i \wedge \Gamma^j_k + F^j_i,$$

- первое тождество Бианки

$$dT^i = -T^j \wedge \Gamma^i_j + e^j \wedge F^i_j,$$

- второе тождество Бианки

$$dF^j_i = \Gamma^k_i \wedge F^j_k - F^k_i \wedge \Gamma^j_k,$$

где e^i дуальный базис к выбранному базису e_i в векторных полях, Γ^i_j локальная 1-форма связности,

$$F^j_i = R^j_{kl,i} e^k \otimes e^l = \sum_{k<l} R^j_{kl,i} e^k \wedge e^l$$

локальная 2-форма кривизны, а T^i локальные 2-формы кручения,

$$T^k = T^k_{ij} e^i \otimes e^j = \sum_{i<j} T^k_{ij} e^i \wedge e^j.$$

Задача 9. Доказать, что тензор Риччи связности Леви-Чивита ∇ является симметрическим, $\mathrm{Ric}(X, Y) = \mathrm{Ric}(Y, X)$.

Задача 10. Рассмотрим двумерную поверхность M в $\mathbb{E}^3$ с индуцированной метрикой и связностью Леви-Чивита. Пусть K гауссова кривизна M. Доказать, что в данном случае

- $\mathrm{Ric}(X, Y) = K\langle X, Y\rangle$, или, в тензорной записи, $R_{ij} = Kg_{ij}$,
- скалярная кривизна равна удвоенной гауссовой, $R = 2K$.