

Рис. 1. Образующая группы крашенных кос

## 8. Крашенные косы. 28 марта 2013

### Образующие группы крашенных кос

Крашенные косы — это косы, нити которых соединяют соответственные точки (точки с одинаковыми номерами). Группу крашенных кос обозначим  $K_n$ .

**Задача 1.** Докажите, что  $K_n = \pi_1(\{(z_1, \dots, z_n) \in \mathbb{C}^n \mid z_i \neq z_j \text{ при } i \neq j\})$ .

**Теорема 1.** *Группа крашенных кос порождена образующими  $b_{ij}$ , где  $1 \leq i < j \leq n$  (см. рис. 1).*

Доказательство проведём индукцией по  $n$ . При  $n = 2$  распрямляем вторую нить. При  $n > 2$  рассмотрим крашеную косу  $d_{n+1} \in K_{n+1}$  и уберём её первую нить. Получится коса  $a_n \in K_n$ . Рассмотрим косу  $a_n^{-1}$  и добавим к ней первую нить, не зацепленную с остальными; в результате получим косу  $d'_{n+1}$ . Последние  $n$  нитей косы  $c_{n+1} = d_{n+1}d'_{n+1}$  можно распрямить. После этого косу  $c_{n+1}$  можно представить в виде произведения кос  $b_{ij}$ . По предположению индукции косу  $a_n$  (а значит, и косу  $d'_{n+1}$ ) можно представить в виде произведения кос  $b_{ij}$ .

### Теорема Александра о гомеоморфизмах диска, неподвижных на крае

Группа крашенных кос тесно связана с группой  $H_n$  изотопических классов эквивалентности гомеоморфизмов круга с  $n$  дырками, неподвижных на крае.




Рис. 2. Доказательство теоремы Александера

**Теорема 2.** *Любой гомеоморфизм круга, тождественный на крае, изотопен тождественному гомеоморфизму.*

Основная идея доказательства изображена на рис. 2.

Другими словами, группа  $H_0$  состоит из единичного элемента.

### Гомеоморфизмы диска с дырками

**Теорема 3.** *Группа  $H_n$  изоморфна  $K_n \oplus \mathbb{Z}^n$ .*

Гомеоморфизму круга с  $n$  дырками, тождественному на крае, можно сопоставить гомеоморфизм круга, тождественный на крае. Этот гомеоморфизм изотопен тождественному. Движение центров вырезанных дисков при этой изотопии задаёт крашеную косу. Эта коса почти полностью определяет гомеоморфизм с точностью до изотопии — нужно только для каждого вырезанного диска добавить траекторию движения одной точки края этого диска. Эта траектория может обвиваться несколько раз вокруг нити, соответствующей центру вырезанного диска.

Каждая образующая  $b_{ij}$  соответствует скручиванию вдоль некоторой кривой; однократное обвивание траектории вокруг нити тоже соответствует скручиванию вдоль кривой.

## ЛИТЕРАТУРА

Прасолов В.В., Сосинский А.Б., Узлы, зацепления, косы и трёхмерные многообразия, 1997. (С. 91–97.)