

## Теорема Дарбу

Пусть  $\langle \cdot, \cdot \rangle$  — невырожденное кососкалярное произведение в  $\mathbb{R}^{2n}$ .

*Задача 1.* (а) Докажите, что для всех  $x \neq 0$  подпространство  $x^\perp \stackrel{def}{=} \{y \in \mathbb{R}^{2n} \mid \langle x, y \rangle = 0\}$  имеет размерность  $2n - 1$ , содержит вектор  $x$ , и  $x^\perp = y^\perp \Leftrightarrow \exists \lambda \neq 0, x = \lambda y$ .

(б) Докажите, что в  $\mathbb{R}^{2n}$  существует базис  $q_1, \dots, q_n, p_1, \dots, p_n$  такой, что  $\langle q_i, q_j \rangle = \langle p_i, p_j \rangle = 0$  при всех  $i, j$ ,  $\langle q_i, p_j \rangle = 0$  при  $i \neq j$  и  $\langle q_i, p_i \rangle = 1$ .

В дальнейшем через  $\omega$  будем обозначать симплектическую форму на многообразии  $M$  размерности  $2n$ , т.е.  $d\omega = 0$  и для всех  $x \in M$   $\omega(x)$  — невырожденное кососкалярное произведение в  $T_x M$ .

*Задача 2.* Докажите, что последнее условие эквивалентно тому, что (внешняя) степень  $\omega^n$  нигде не обращается в нуль.

Отсюда следует, что симплектическое многообразие ориентируемо.

*Задача 3.* Докажите (используя предыдущую задачу), что симплектическая форма на компактном многообразии не может быть точной:  $\omega = d\alpha$  невозможно.

Отсюда следует, например, что на четырехмерной сфере (у которой  $H^2(S^4) = 0$ ) не существует симплектической структуры.

*Задача 4.* (а) Докажите, что 2-форма  $\omega = \frac{dz \wedge d\bar{z}}{1+|z|^2}$  на  $\mathbb{C}$  продолжается до симплектической структуры на  $\mathbb{C}P^1$ .

(б) Докажите, что формула  $g(x)(v_1, v_2) = \omega(x)(iv_1, v_2)$  (где  $v_1, v_2 \in T_x \mathbb{C}P^1$ ) задает на  $\mathbb{C}P^1$  риманову метрику, и вычислите подгруппу в группе проективных преобразований  $\mathbb{C}P^1$ , относительно которой эта метрика инвариантна.

Рассуждения в последующих задачах происходят в малой окрестности точки  $x \in M$ , поэтому можно считать, что все происходит в окрестности нуля в  $\mathbb{R}^{2n}$ , и  $\omega = \sum_{1 \leq i < j \leq n} \omega^{ij}(x) dx_i \wedge dx_j$ . Обозначим  $\omega_0 = \omega^{ij}(0) dx_i \wedge dx_j$ .

*Задача 5.* Докажите, что в достаточно малой окрестности нуля все формы  $\omega_t = t\omega + (1-t)\omega_0$ ,  $0 \leq t \leq 1$ , являются симплектическими формами.

*Задача 6.* (а) Докажите, что в окрестности нуля существует векторное поле  $X_t$  такое, что  $di_{X_t} \omega_t = -\frac{d\omega_t}{dt}$ .

(б) Докажите, что если  $\varphi_t$  — поток (т.е., интегральные траектории) поля  $X_t$ , то  $\varphi_t^* \omega_t \equiv \omega_0$ .

(в) Докажите теорему Дарбу: в достаточно малой окрестности любой точки многообразия  $M$  существуют координаты  $q_1, \dots, q_n, p_1, \dots, p_n$  такие, что  $\omega = dq_1 \wedge dp_1 + \dots + dq_n \wedge dp_n$ .