

Дифференцируемая функция F на интервале (a, b) называется первообразной или неопределенным интегралом функции f , если $F' = f$. Далее обозначаем $F = \int f(x) dx$. Ясно, что функция F определена с точностью до добавления константы.

Задача 1. Раскладывая на простейшие дроби укажите алгоритм интегрирования произвольной рациональной функции. Найдите $\int \frac{1}{1+x^4} dx$.

Задача 2. Найдите все такие непрерывные функции F , что F дифференцируема всюду кроме не более чем счетного множества точек и $F' = f$, где

$$(a) f(x) = (-1)^{[x]}, \quad (b) f(x) = \frac{1}{(\sin^2 x + 2 \cos^2 x)^2}, \quad (c) f(x) = \frac{x^2}{(x \sin x + \cos x)^2}, \quad x \in (0, \pi/2).$$

Задача 3.

(a) Пусть $G = \int g(y) dy$ и $F = \int f(x) dx$ на (a, b) . Докажите, что дифференцируемая функция $y(x)$ удовлетворяет уравнению $g(y)y' = f(x)$ на интервале (a, b) тогда и только тогда, когда верно равенство $G(y(x)) = F(x) + C$ для всех $x \in (a, b)$ и некоторого C . Решите уравнение $y' = \lambda y$.

(b) (Остыивание чайника) Исходя из того, что скорость остывания чайника пропорциональна разности его температуры и температуры воздуха, выведите зависимость температуры чайника от времени и оцените время его остывания до комнатной температуры.

(c) (Водяные часы) Известно, что скорость истечения воды из небольшого отверстия на дне сосуда достаточно точно может быть вычислена по формуле $0,6\sqrt{2gH}$, где g – ускорение силы тяжести, а H – высота уровня воды над отверстием. Какую форму должен иметь сосуд, являющийся телом вращения, чтобы при стечении из него воды уровень воды понижался равномерно?

Задача 4. Найдите:

$$(a) \int_{1/10}^{10} \frac{\ln x}{1+x^2} dx,$$

$$(b) \int_0^1 \frac{f(x)}{f(x)+f(1-x)} dx, \text{ где } f \text{ – непрерывна на } [0, 1] \text{ и } f > 0,$$

$$(c) \int_{-1}^1 f(x) dx, \text{ где } f \text{ – непрерывна на } [-1, 1] \text{ и } pf(x) + qf(-x) = 1, p+q \neq 0.$$

Задача 5.

(a) Пусть ψ – выпуклая функция на \mathbb{R} , f – непрерывная функция и $f \geq 0$. Докажите неравенство Йенсена: $\psi\left(\int_0^1 f(x) dx\right) \leq \int_0^1 \psi(f(x)) dx$.

$$(b) \text{ Пусть } f > 0 \text{ – непрерывная функция. Найдите } \lim_{p \rightarrow +\infty} \left(\int_0^1 f^p dx \right)^{1/p}.$$

Задача 6. Пусть $f : [1; +\infty) \rightarrow (0; +\infty)$ – монотонно убывающая непрерывная функция. Докажите, что ряд $\sum_n f(n)$ сходится тогда и только тогда, когда существует $\lim_{M \rightarrow \infty} \int_1^M f(x) dx$. Исследуйте сходимость ряда $\sum_n \frac{1}{n^p \ln^q n}$.

Если существует предел $\lim_{M \rightarrow \infty} \int_a^M f(x) dx$, то говорят, что f интегрируема на $[a, +\infty)$ в несобственном смысле и значение предела обозначают через $\int_a^{+\infty} f(x) dx$.

Задача 7.(Эйлер) Предположим, что функция f непрерывно дифференцируема на $[1, +\infty)$. Тогда верно равенство

$$\sum_{n=M}^N f(n) = f(M) + \int_M^N f(x) dx + \int_M^N \{x\} f'(x) dx,$$

где $\{x\}$ – дробная часть числа x . Обоснуйте сходимость ряда $\sum_n \frac{\cos \sqrt{n}}{n}$.

Задача 8. Пусть f – дважды непрерывно дифференцируема на $[0, +\infty)$, причем $|f|^2$ и $|f''|^2$ интегрируемы на $[0, +\infty)$. Докажите, что $|f'|^2$ интегрируема на $[0, +\infty)$.

Заметим, что dx_k (дифференциал функции $f(x) = x_k$) является линейной функцией на \mathbb{R}^n , причем всякая линейная функция L может быть записана в виде $L = a_1 dx_1 + a_2 dx_2 + \dots + a_n dx_n$. Если задано отображение $\omega: x \mapsto L_x$, сопоставляющее каждой точке открытого множества $U \subset \mathbb{R}^n$ линейную функцию L_x , то говорят, что на U задана 1-форма ω или дифференциальная форма ω степени 1. Далее пишем $\omega(x) = a_1(x)dx_1 + \dots + a_n(x)dx_n$. Типичный пример 1-формы – дифференциал функции f . Форму ω можно проинтегрировать по гладкому пути $\gamma: [0, 1] \rightarrow U$ следующим образом:

$$\int_{\gamma} \omega = \int_0^1 a_1(\gamma(t))\dot{x}_1(t) + \dots + a_n(\gamma(t))\dot{x}_n(t) dt.$$

Кривую можно параметризовать различными способами. Непрерывно дифференцируемая функция $t(\tau)$, отображающая $[0, 1]$ на $[0, 1]$, называется допустимой заменой параметра, если $t' \neq 0$.

Задача 9. Докажите, что модуль выражения $\int_{\gamma} \omega$ не зависит от допустимой замены параметра $t(\tau)$, а знак меняется или не меняется в зависимости от отрицательности или положительности функции t' .

Задача 10. Докажите, что $\int_{\gamma} df = f(\gamma(1)) - f(\gamma(0))$.

Задача 11. Пусть γ – гладкая замкнутая ($\gamma(0) = \gamma(1)$) кривая на плоскости, не проходящая через $(0, 0)$. Докажите, что выражение

$$\frac{1}{2\pi} \int_{\gamma} \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2}$$

равно целому числу. Найдите это число для случая, когда $\gamma(t) = (\cos nt, \sin nt)$. Каков геометрический смысл этого целого числа?

Указание: вычислите $d\left(\operatorname{arctg} \frac{y}{x}\right)$.

Если форма является дифференциалом некоторой функции, то говорят, что эта форма точная. Из задачи 11 видно, что не всякая 1-форма является точной.

Задача 12. Пусть $a_k(x)$ – непрерывно дифференцируемые функции на \mathbb{R}^n . Предположим, что $\frac{\partial a_k}{\partial x_i} = \frac{\partial a_i}{\partial x_k}$. Докажите, что форма $a_1 dx_1 + \dots + a_n dx_n$ является дифференциалом некоторой функции f .

Указание: $f(x) = \int_0^1 x_1 a_1(tx) + \dots + x_n a_n(tx) dt$.